


F. XVIII 14  
55048/B

39.429









COMMENTARIUM  
NOSOLOGICUM,  
Morbos Epidemicos  
ET  
AERIS VARIATIONES  
IN  
Urbe EBORACENSI  
LOCISQUE VICINIS,

Per sedecim Annos grassantes complectens.

AUCTORE  
CLIFTONO WINTRINGHAM.



LONDINI,  
Typis GUL. BOWYER;  
Impensis J. WALTHOE, è regione *Excambii*  
*Regii*, in vico vulgo dicto *Cornhill*.  
M DCC XXXIII.

COMMENTARIUM  
NOSOLOGICUM


Morborum Epidemicorum  
39429 ET

ANALYSIS VARIATIONES  
IN  
URBE BORACENSIS  
LOCISQUE VICINIS

Per Robertum A. Jones, Græcæ et Latine

AUCTOR

Clarendon, Wiltshire.



LONDON:  
Printed by J. W. ...  
...  
...  
...  
...





Viro Clarissimo

RICHARDO MEAD, M. D.

CLIFTONUS WINTRINGHAM,

S. P. D.



*UM ex hortatu tuo, vir  
amplissime, jam denu  
prodit hic Libellus, jure  
quodam, te sibi Patro  
num vendicat : Et revera quis Hip  
pocraticam observandi methodum æ  
que tueatur, ac qui, tam Veterum  
quam Recentiorum doctrina politus,*



*summa cum laude, Divini senis  
munere fungitur. Ne autem, dum  
vera commemoro, tibi moram tæ-  
diumve faciam, plura non addam;  
neque aliud petam, quàm, ut pub-  
licum hoc nostræ observantiæ testimo-  
nium æqui bonique consulas, meque  
tibi devinctissimum habeas.*

*Dabam Eboraci*

*Calend. Martii*

*1732.*



Confan-



Consanguineo suo perquàm Dilecto

*FRANCISCO WILKINSON*

ARMIGERO


LIBELLUM Hunc

Amoris ergô dicat

CLIFTONUS WINTRINGHAM.

A 3

PROLE-



Contingentes pro pignori Dilecto

FRANCISCO WILKINSON

ARMIGERO

LIBELLUM Hunc

Amoris ergo dicit

Christophe Wintlingham

PROLE-

A 2





## PROLEGOMENA.



Irari mihi non rarò subiit,  
quòd, cùm non solum  
mutationes & successio-  
nes, sed ipsæ etiam mor-  
borum acutorum origines, com-  
muni medicorum consensu aeri tri-  
buuntur, nemo ab ipso Hippocratis  
ævo ad hoc usque tempus, (periodo  
scilicet plusquam duorum annorum  
millium) unquam animum, vel ad  
eorum mutationes & successiones,  
vel aeris temperamenta eos comi-  
tantia, per notabilem aliquam an-  
norum seriem, solo excepto Syden-  
hamo, observandum appulit. Hæc  
A 4 autem

autem ei non immerito tribuatur incuria, quòd cùm morbos per plures annos epidemicè grassantes stylo eleganti perspicuè delineavit, vix verbum de aeris comitantis temperamento addidit.

Affiduum in his observandis per plures annos tædium, multos ab hoc opere proculdubiò deterruit, & in causâ fuit, quòd paucis Hippocratis observationibus contenti huc usque decubuerunt medici; cæteraque omnia quasi inscrutabilia posuerunt.

Hac in re ignaros quosdam Geographos imitati sunt, qui oceanis immensis, vastisque desertis chartas geographicas complent, hac solâ ratione inducti, quòd deficit descriptio.

Horum morborum causas exponere, non hujus est libelli; placet enim eas tantum morborum successiones & symptomatum varietates, variaque aeris temperamenta eas comitantia,

mitantia eo ordine describere, quo per sedecim annos jam proximè elapsos, in hac urbe locisque vicinis, se palam fecerunt.

Ad quantam in horum morborum causis investigandis, quantamque in Phænomenis dignoscendis, certitudinem, fida per multos annos continuata, nos tandem perduceret historia, nequaquam novi; hoc tamen satis patet, quòd quamdiu tali auxilio destituti sumus, theoriam ullam certam, & rebus ipsis congruam, frustra stabilire conabimur.

His fretus ratiociniis, observationes sequentes publici juris facere decrevi, eâque simplicitate delineare, quâ in propriis commentariis per prædictos annos descripseram; non tam quòd aliquid novi me medicis declaraturum suppono (res enim jam præteritas, & à pluribus forsan observatas solùm recordor) quàm ut alios



lios ad utilissimam hanc medicinæ partem, olim adeò celebratam, prosequendam excitarem.

Morbi in his commentariis post-hac enumerati, sunt Epidemici & Sporadici, quos egomet observavi; symptomatum etiam variationes, ad eorum singulos pertinentes, pro viribus fideliter & accuratè descripsi, nullâ commotus cupidine theoriam aliquam ex his excitandi fundamentis.

Non equidem me latet quosdam dari medicos, qui hujusmodi morbos nullas, aut saltem paucas, mutationes subire contendunt, ex iis Aeris qualitatibus quæ sensibus nostris apparent, quales sunt caliditas, frigiditas, humiditas, aliaque ejusmodi; symptomatum autem variationes, & morborum successiones ex subtili quadam materie prorsus ignota, sensibus nostris nequaquam obvia, aliisque hujusmodi figmentis  
philo-

philosophicis deducere conantur. Dari quidem tales particulas, satis docent pestilentiarum, aliorumque morborum contagioforum historiæ; cur tamen ad has, in singulis annis pro iis morborum acutorum phænomenis solvendis, confugiendum est, ad quæ sufficerent qualitates sensibiles, non equidem video. Quicumque enim animum ad veritatem investigandam, ab observationibus assiduis tantum proveniente applicabit, certo inveniet, quod non solum morbi eâdem essentiâ gaudentes, ab his causis varietatem in symptomatibus patiuntur, sed alii specie diversi producuntur, & non rarò omnia morbi regnantis phænomena adeò in alia commutantur, ut alterius morbi speciem præ se ferant.

Hippocratem, medicorum facile principem, de hâc re ità sensisse, docuit insignis ejus cura, in varias aeris  
tempe-

temperaturas, variaque morborum phænomena enumerando, quam passim in operibus, præcipuè verò in Epidemicis deprehendimus. Neque hoc contentus fuit auctor eximius, quin etiam aeris statum morbi ingressum præcedentem, æque ac comitantem, unà cum ventorum ad diversas plagas mutationibus, annorum tempestatibus, aliisque ejusmodi non rarò describit. In quibus omnibus enumerandis vix opus suum impenderet, & multo minus variarum tempestatum accuratam cognitionem, ut imprimis necessariam, in lib. 1. & 3. Epidemicorum tantopere inculcaret; modo de eorum effectibus, ex fidis experimentis non satis sibi persuasum habuit.

Observavit etiam olim Sydenhamus, licèt ad occultas aeris qualitates causam attribuat, morbos epidemicos in diversis aeris constitutionibus



a se mutuo adeo differre, “ ut quâ  
“ methodo, currente anno ægrotos  
“ liberaveris, eâdem ipsâ, anno jam  
“ vertente, forsitan e medio tolles.”  
Quæ quidem assertio restrictione levi  
vera est; ut probant morborum, in  
duabus primis ejus constitutionibus,  
Symptomata. Fuit enim febris po-  
sterior priore magis inflammatoria,  
symptomatibus acrioribus comitata,  
Hyememque summè frigidam, anni  
scilicet 1664, ob diuturnum gelu,  
subitamque ejus solutionem, in an-  
nalibus adeo celebratam, secuta est.  
Quæ aeris temperies cum succedente  
comparata, ob insuetam caliditatem  
ventorumque inopiam æquè nota-  
balis, cuivis rem seriò perpendenti,  
hujus effectus satis perspicuam red-  
dunt rationem; imò dum qualita-  
tes aeris occultas, ut horum effectuum  
causas, stabilire conatur lauda-  
tus auctor. Hic verò non pestem,  
quæ

quæ hoc anno, viz. 1665 irrupit, sed febrem continuam, quæ tempore verno se palam faciebat, intelligo. Præterea quis non novit, pro diversis aeris constitutionibus, nunc febres languidas, debilitate summâ, spirituum languore, largisque sudoribus comitatas; nunc febres verè inflammatorias, his omnino contrarias grassari; & curationem longè diversam, ne dicam contrariam, postulare.

Non mea autem est sententia, quod exigua quælibet aeris variatio in calore, pondere, humiditate, aliisque sensilibus ejus qualitatibus corpora nostra in hunc modum afficere valeat, sed ex solæ, quæ in stabili-  
oribus Aeris temperamentis accidunt, five a deteriore in temperamentum magis salutiferum, seu in oppositas partes deflectant. Hoc autem certò novi, minores in his variationes  
teneros

teneros, delicatulos & morbidos afficere, quàm vulgò concludere solemus.

Nec ideo me mea fert opinio, ut omnem febrem ab aere solo produci existimarem, quippe eas a quàm plurimis causis, huic longè diversis, præcipuè ab erroribus in usu reliquorum non-naturalium oriri, quotidiana docet experientia. Has verò ipsas, a principiis ut ut remotis productas, se Epidemicis regnantibus accommodare, quantum finit morbi indoles, omnibus in confesso est. Unde verò hoc fieret, nisi a causâ quâdam generali, tam solida quàm fluida, peculiari quâdam ratione mutante, & excitato aliundè ardore febrili morbum ad certam speciem determinante, vix alio solvi potest. Talem autem causam, imò & sufficientem, scimus esse aerem ; cur verò non latius vires extendat

mirabilis temperamentorum diversitas, quam hactenus observarunt medici, assertio nimis est temeraria, priusquam de his omnibus, ex fidis experimentis, res clariùs patebit.

Nullus dubito quin medicis satis notum est, morbos quosdam singulares, peculiari modo, ad certas quasdam anni tempestates, præ cæteris, pertinere; etiam si in omnibus non raro inveniantur. Cujus generis sunt pleuritides, anginæ, aliique morbi inflammatione conjuncti, qui vernale tempus præ cæteris occupant. Quippe hyemis frigore densantur fluida, stringuntur corporis solida, & coarctantur vasorum canales: ad aucto autem in vere calore, rarefcit sanguis, turgescunt vasa quædam immeabilia, & sequuntur morbi prædicti. Quibus etiam addi possint Febres quartanæ intermittentes, mor-  
bus



bus Cholera dictus, aliique ejusmodi morbi Autumnalem tempestatem occupantes. Quorum omnium phænomena a sensilibus aeris qualitatibus deduci possint; qua tamen ratione ex Subtili, nescio qua, Materie, non equidem novi.

Hujus methodi tam veritatem, quàm utilitatem adeo clarè cognovit Hippocrates, ut non solùm totam ferè Aphorismorum sectionem, in iis morbis enumerandis consumpserit, qui particulari quadam ratione certas Anni tempestates occupant; quin eas etiam adjunxit Symptomatum varietates, quas in his, ex variis Aeris temperamentis, profluere expertus novit. His fretus ratiociniis, morbos brevi adventuros prædixit divinus Senex; an autem ad æqualem in his prædicendis Sagacitatem, alii hac methodo etiam ascenderent, non affirmarem; hoc

B autem

autem pro certo ponere liceat, quòd si hujusmodi Observationes ad hoc usque tempus, eâdem Fidelitate & Ingenii acumine perductæ fuissent, Morborum Epidemicorum naturam a primo exortu clariùs dignoscere-mus; in quibus discernendis, non parum hæsitant Medici celeberrimi.

Objiciunt quidam Scriptores incauti, tantum dari discrimen inter Aeris Græciæ temperamentum & hujus Insulæ, ut observationes ab Hippocrate institutæ prorsùs inutiles Nobis evadant. Hæc autem Assertio ignorantiae asylum merito nuncupari potest, & utcunque primâ facie veritatis speciem præ se ferat, falsam esse demonstrabit experientia.

Quamvis enim necessariò concedendum est, Morbos quosdam peculiari modo certas Regiones, certaque Climata præ cæteris afficere, & exinde gradu aliquo ab iis, Regiones

nes diversas occupantibus, diversos esse; quamvis etiam concedendum est, quod Observationes certâ quâdam regione institutæ, iis in alterâ institutis, quasi puncto non congruant, maximâ tamen ex parte veræ invenientur; eò quòd, Mutationes in Aere ipso ad gradus proportionales in Locis utrisque, amborum Incolas ratione proportionali afficere necesse est. Ut ab effectibus Caloris, Frigoris, aut aliarum aeris qualitatum sensibilibium etiam sensibus apparet.

Ponamus enim, exempli gratiâ Regiones duas ita esse fitas, ut naturalis Aeris Calor unius, Calorem alterius viginti Thermometri gradus, aliave qualibet ratione exsuperet; ex hoc tantum sequetur, quod subitanea Aeris mutatio vel Frigiditate, vel Caliditate, ad gradus in utrisque proportionales, amborum Incolas,

quatenus ad caloris aut frigoris effectus pertinet, pari modo afficiet ; eâdem enim in ratione constringuntur vel laxantur fibræ, densantur vel expanduntur fluida, materiaque perspirabilis gradu proportionali in utrisque afficitur.

Hinc accidit, quod pleuritides, anginæ, dysenterix, febres putridæ, continuæ remittentes, & intermittentes in quacunque Regione, omnique Climate inveniuntur ; licet a se invicem variationes aliquas patiantur, vel a situ loci, variis Incolarum vivendi modis, particulari constitutionum idiosyncrasiâ, diverso frigoris applicandi more aut gradu, aliisve ejusmodi.

Hoc autem me præ cæteris ratio-  
ciniis in hâc stabilit sententiâ, quod  
eosdem morbos accidisse, easdem-  
que variationes in OEconomia Ani-  
mali, subitaneum Thermometri as-  
censum



cenſum vel deſcenſum ad gradus proportionales conſecutas eſſe, comperi; ſeu in Æſtate, vel Hyeme, accidebat hæc aeris variatio. Quod quidem Phænomenon, etiamſi a nullo hætenus prout novi obſervatum, clariffimè demonſtrat, quòd neque morborum, nec Symptomatum variationes, a gradu Caloris aut Frigoris cuilibet Regioni, aut anni Tempeſtati peculiare, ortæ ſunt; ſed ad majorem in aere mutationem, quam cum ſalute OEconomix Animalis, præcipuè corporis morboſi, conſiſtere poteſt, jure ſunt tribuendæ, quouſque ſaltem ex calore aut frigore pendent morborum Variationes.

Præterea ſi Morbos Epidemicos ab Hippocrate deſcriptos ad examen deducamus, aeris que Temperamenta eos comitantia & antecedentia, cum iis morbis, qui in hac Regione, ſub eiſdem aeris Temperamentis acci-

dunt, comparemus, discrimen adeo latum non apparebit, ut stabilire conantur Observatores hi nimis perfunctorii; & adeo non inutiles ejus Observationes æstimeri debent, ut nullas iis æquales norim, aut me brevi visurum autumem.

De aeris effectibus præ cæteris omnibus optime judicant sensationes nostræ, quibus solis usus est Hippocrates, cum eodem gradu afficitur corpus; etiam si ulteriorem in his lucem afferant Barometrum, Hygroskopium, & præ cæteris Thermometrum; eo quod, majores mutationes a caloris frigorisque variatione subit corpus, quàm reliquarum qualitatum. In his tamen non leve discrimen adest, an cum siccitate vel humiditate, minori vel fortiori venti spirantis afflatu, conjungatur idem caloris vel frigoris gradus, non tantum ob varium aeris elaterem, quo expan-

expanditur pulmo, & augetur vel diminuitur sanguinis velocitas, sed præcipue ob majorem vim qua imprimitur frigus, majoremque aquæ quam aeris densitatem; quod etiam de Hydrargyro, aliisque corporibus pro ratione ponderis verum est. Hunc vero effectum clarè percipit corpus nostrum, quamvis ex Thermometro notari nequit; quippe aqua, eundem caloris gradum cum aere ambiente ex Thermometro notans, corpori applicata, sensum frigoris, omnesque frigoris effectus statim producit. Pari modo de ventorum afflatibus præcipue fortioribus habenda est ratio; fortis quippe venti afflatus, atmosphæram corporis calidam dissipando, sensum frigidi corpori inducit, quod ex Thermometro observari nequit. Hoc enim licèt minoris majorisve venti afflatui expositum, cæteris pa-

ribus, nullam inde subit mutationem, licèt reale frigus percipiat corpus. Ideoque quamvis ex his instrumentis, cum sensationibus nostris comparatis, certiores & elegantiores fiant observationes, quàm ex solâ sensuum ope expectare licet, cum sensibus tamen nostris accuratè congruere nequeunt, fientque revera secundum sensationes nostras in corpore mutationes. Constrictâ nempe parte aliquâ, citiori fluxu in loca vicina propellitur sanguis, ibique distentiones, defluxiones, morbosque omnes independentes producet. Hoc nosse Hippocratem ex scriptis patet, & proinde cum ex his causis oriuntur, & in æternum orituri sunt morbi, vere monebunt sapientes ejus observationes.

Incertum Aeris in hac Insula temperamentum in causâ est, quod hujusmodi Observationes in Methodum generalem, assiduo sine labore, longâque



longâque Observationum ferie nequaquam reduci possunt, & hoc majori ratione, quàm in iis Regionibus, quæ stabiliori Aeris Temperamento gaudent; quod tamen operæ pretium non sit, ex hac assertione vix colligi potest.

Frequentes etiam aeris in hac Insulâ variationes, ad hanc observandi incuriam plurimùm contulisse nullus dubito. Corpora enim nostra Mutationibus his adeo sunt assueta, ut familiares fiunt, & vel prorsus negliguntur, aut saltem minimi momenti æstimantur, malaque hoc ex fonte orientia, Causis longe remotioribus, minusque validis non raro tribuuntur.

Observavi supra quod Hippocrates non tantùm aeris Temperamenta Morbos regnantes comitantia, sed iis etiam antecedentia frequenter describit, & nonnunquam præcipuas  
Aeris

Aeris Variationes per totius Anni tractum, antequam ad morbos tum grassantes delineandos se accingat, quæ Methodus observatu admodum est necessaria ; quippe hujus ope, ad statum tam Fluidorum, quam Solidorum, rite intelligendum, quasi manu deducimur. Datis enim Temperamenti antecedentis æquè ac præsentis Effectibus, Humorum status non tantùm clariùs apparet, sed harum Mutationum causæ primariæ, fere ad sensum demonstrantur.

Observatu etiam non est indignum, quod Morbi, qui clarissimè ab aeris temperamentis profluunt, seipso frequentèr non ostendunt, priusquam in aliam commutatur aeris Temperies. Quod quidem Phænomenon, Successiones eorum inter se invicem comparandi necessitatem demonstrat, eo quod, hos morbos

morbos, tam a prægressa aeris temperie, quàm à variis plurimarum inter se invicem combinationibus mutationes subire ostendit. An autem his, vel aliis cujuscunque generis causis, tribuendæ sunt eorum variationes, aliis tractandum relinquam; & multo minus, de causis epidemicorum originalibus, hic sermonem instituam; quippe ad hæc stabilienda defunt observationes, & res ipsas agito, non hypotheses fingo.

Quæstiones quasdam, lector benevole, numeris in textu respondententes, in margine invenies, quas inferere non prorsus inutile duxi; quoniam in hujusmodi observationibus instituendis, eas aliis ansam præbere posse existimo; & etiam quod in praxi, saltem minus expertis, forsitan sint emolumento. Has autem non ut veritates certas & fidas, sed tantum

tantum ut effectus, observatu non prorsus indignos, & probabiliter ex causis ibidem descriptis orientes, propono.

Nullos singulares Ægrorum casus adjeci; quippe si omnes enumerassem, eosque singulis annis inter se comparassem, in immensum assurrexisset libri moles; si autem paucos quosdam selegissem, nihil ex his de morborum speciebus, variiisque eorum phænomenis, in singulis annis apparentibus, concludere potuisset lector.







# COMMENTARIUM NOSOLOGICUM.



Empeſtas brumalis anni Annus  
1715

1715 admodum fuit frigida, largâ nivis copiâ, & extremo gelu conjuncta. Duravit hæc aeris temperies per ſex hebdomadas, ſpirantibus ventis ut plurimum ex plagis auſtralibus.

Spiritus in thermometro meo uſque ad gradus 90 deſcendebat, quod in nullâ aliâ tempeſtate, a me hæctenus obſervatâ novi; rariffime enim ultra 84 vel 85 deſcendit. Mercurius etiam in barometro altiffimè

tiffimè affurgebat; durante enim gelu prope  $\frac{1}{2}$  pollicis partes altiùs perffitit, quàm in aliis, etiam ficciffimis quas novi, tempeftatibus.

Sæviente gelu graffiabantur morbi inflammatorii, præcipuè pleuritides, angina, rheumatismi, dolore acuto, & pulsu duro conjuncti. Sanguis in hujusmodi morbis plurimum fuit inflammatus & pelliculâ crassâ obductus, neque sine largâ ejus missione, eâque pluriès repetitâ levabantur Ægri.

Qui morbo quolibet diuturno laborabant, hoc tempore male se habebant, præsertim vero Phthifici & Tabidi; augebantur enim tussis & spirandi difficultas, excruciabant etiam eos dolores pleuritici, alvi-que fluxus insanabilis.

Resoluto autem in *Februario* gelu, non parum augebatur ex morbis inflammatoriis ægrorum numerus, &  
symp-

symptomata acriora fiebant. Tabidis etiam admodum exitialis evasit hæc aeris mutatio; augebantur enim plurimis diarrhœæ, & perierunt multi. Alii etiam cujuscunque generis languidi, a cœli variatione non parum patiebantur, & alvi fluore, intestinorum doloribus, urinæ difficultatibus, symptomatibus asthmaticis, hysteriis, & hypochondriacis præ cæteris laborabant; quæ omnia, in iis quibus sufficiebant vires, paucis evanescere diebus; aliis verò, vel statim fuerunt exitialia, aut ex virium collapsu prava induxerunt symptomata. (1). (2). (3).

Hoc

Q U Æ S T. (1). Subsidebat Mercurius duos pollices circa gelu dissolutionem, & ascendebat in thermometro spiritus gradus viginti; hanc aeris variationem notabilis humorum turgescencia fuit comitata, quæ somnolentiâ, alvi fluore, doloribus arthriticis, & rheumaticis, tam vagis quam fixis, & in quibusdam nervorum resolutione & apoplexiis morbisque jamjam descriptis,

se

Hoc tempore plurimùm grassabantur variolæ, Confluentes fuerunt & moris maligni, & hoc, maximo gradu durante extrema frigiditate.

Duraverunt prædicti morbi inflammatorii per totam tempestatem vernalem, appropinquante autem Æstivitate rariores fiebant. Variolæ etiam grassabantur, & confluentes plerumque fuerunt, minori tamen gradu quàm in hyeme præcedente.

Annus  
1716

Æstiva tempestas anni 1716 ad caliditatem vergebat, non tamen

sepalam faciebat. Quæritur itaque an subitanea humorum rarefactio, a diminuto atmosphæræ pondere, & aucto calore in gelu solutione producta, horum effectuum non fuit causa primaria?

Q U Æ S T. (2). An morbi hujusmodi crisin quandam non sunt æmulati; natura per has vias nimiam humorum copiam, & in vasa pressuram, excludere moliente?

Q U Æ S T. (3). Annon itaque ex evacuationibus pro morborum variatione institutis, præ cæteris, petenda sanatio?

æquè



æquè fuit calida, ac æstates quædam subsequentes, spirantibus plerumque ventis ex plagis occidentalibus.

Morbi hac tempestate vigentes fuere Febres quædam continuæ Remittentes, a Græcis *συνεχέεις* dictæ, & Febres languidæ nervosæ.

Cutis in prioribus aspera fuit & solito ficcior, pulsus durus, & sanguis pleuriticorum more inflammatus. Parum admodum sudabant, at delirabant frequenter ægri, præsertim in remittentium paroxysmis. Nonnulli etiam in initio diarrhœis & vomitu, doloribus pleuriticis & rheumaticis affecti sunt; quæ omnia missione sanguinis, Emetico leni, & diluentibus antiphlogisticis, pro re nata institutis, levabantur. Circa autem diem decimum quartum hæ Febres per sudores judicatæ sunt; & vel ex toto cessabant; vel in In-

C

termit-

termittentes tertianas convertebantur.

In Febribus nervosis diutiùs ægrotabant, pulsus celer fuit & debilis, cutis ficca & aspera, quod postremum in his morbis frequenter aliter accidit, ob sudores partiales & erraticos his Febribus, aliis sæpiùs, supervenientes.

Duraverunt etiam variolæ per totam æstatem usque ad autumnum, sensim tamen decrevit malignitas; Hyeme tamen sequenti evanuerunt, permanentibus adhuc febribus nuperrimè descriptis.

Hyems proxime subsequens, viz. anni 1716, circa finem frigida fuit & gelosa, minori tamen gradu quàm in anno prædicto. Subsistebat enim thermometri spiritus tantum ad gradus 84, durante maxima hujus tempestatis frigiditate.

Frigidâ hac temperie, iidem ferè morbi ac in hyeme præcedente se ostendebant

ostendebant, tam durante gelu, quàm circa ejus solutionem ; symptomata tamen mitiora fuerunt, & numerus Ægrotantium minor (4).

Æstas anni subsequētis, viz. 1717, <sup>Annus 1717.</sup> calida fuit & sicca circa mediam ejus partem, spirantibus, ut plurimum, ventis ex Plagis quibusdam Australibus & Occidentalibus.

Hoc anno, præ cæteris morbis, grassabantur febres Remittentes & Intermittentes, præcipuè tamen priores, & hoc majori numero quàm in anno præcedente. In morbi initio remissionem aliquam vix senserunt Ægri; *συνόχαις* enim quam maximè similes fuerunt; paucis ta-

QUÆST. 4. Annon major villorum contractio & fluidorum inspissatio, in anno proximè elapso, ob extremam Hyemis Frigiditatem, in Causâ sint, quod hujusmodi Morbi acriores & frequentiores in illâ, quàm hac Tempestate evaderent? Et annon horum effectuum ratio a natura Aeris, Caloris, & Frigoris satis patet?

men elapsis diebus, nunc per alvum, nunc per meatus cutaneos, imperfecta succedebat Crisis, & vel ad intermittentium vel remittentium exclassem pertinere se ostendebant.

Urina ante Crisin excreta plerumque flammea fuit, & sedimenti expers, nonnunquam turbida; Crisi tamen finitâ, sedimentum ad lateritium inclinans deponebat, coloris autem pallidioris & ad Flavedinem accedentis.

Autumnus subsequens humidus fuit & frigidus, spirantibus frequenter ventis septentrionalibus.

Grassabantur adhuc morbi prædicti, & accedebant Diarrhœæ quædam & Dysenterix febre lentâ conjunctæ, quæ ægros morbis descriptis laborantes malè afficiebant, spiritus prostrabant, & morbi tædium augebant.

Hyems



Hyemis proximè subsequens acri gelu, & nive multâ circa medium comitata fuit, spirantibus ut plurimùm ventis, vel ex plagis orientalibus, vel septentrionalibus.

Durante gelidâ tempestate, iidem fere morbi apparuere, ac in Hyeme præcedenti, & manserunt adhuc, licet non admodum frequentes, συνεχεῖς descriptæ.

Æstiva Tempestas anni 1718 ca- Annus  
1718.  
lida fuit & sicca, præcipuè in Julio & Augusto, quæ aeris temperies per totum Autumnum permanfit, ratione habitâ ad necessarias anni variationes; spirantibus ventis ex plagis australibus & occidentalibus.

Hac Æstate erupit Febris putrida a Græcis σύνοχος dicta, symptomatibus mali moris comitata. Cùm autem Ægrorum de hoc morbo numerus, anno subsequente plurimùm

augebatur, descriptionem ejus ad eum remittam.

Graffabantur adhuc febres Remittentes, paroxyfmis autem magis incertis, & symptomatibus acrioribus conjunctæ.

Hæ per totam Hyemem manferunt, & frequentius quàm præcedente apparebant, licèt non paucae hyemis frigore in intermittentes convertebantur. Graffabantur etiam plurimùm intermittentes tertianæ per totam hanc anni tempestatem Paroxyfmis regularibus comitatæ; fenfim tamen veris initio intervallis minus certis redire incipiebant paroxyfmi, & augebatur pro ratione æstatis appropinquantis remittentium numerus ufque ad calidam Æstatis fubfequentis temperiem.

Annus : Æftas anni 1719, non folùm  
1719. omnes alias a me hætenùs obfervatas Caliditate fuperabat, fed etiam, majorem, magisque fubitaneam in  
tempe-

temperamento passâ est Variationem, quàm in aliâ qualibet observavi.

Duraverunt Calores ab initio mensis Maii usque ad Julii medium, fuitque siccitas aeris magna. Parùm admodùm spirabant per totam hanc periodum Venti; qui tamen apparebant, ex plagis Australibus veniebant; manente tum Thermometro ad gradum 17. His ita se habentibus, subitò accidebat ingens Cœli Variatio; spirabant enim fortitèr venti Boreales, decidebant pluvix quædam frigidæ, & 48 horarum spatio subsidebat spiritus usque ad gradum 45, quæ longè maxima est variatio, quàm in eodem temporis Intervallo unquam novi.

Gradus autem frigoris, quo afficiebantur Animalium corpora, a vento tum fortiter spirante, longè major æstimari debet, quàm monstravit Thermometrum, ob rationes

supra allatas ; licèt vix accuratè æstimari potest.

Duravit hæc frigida aeris temperies vix ultra duas hebdomadas, & subitò redibat Calor ; qui per reliquam Æstatis partem & autumnii initium perdurabat ; & manebat aer calidus ratione habitâ ad anni tempus, usque ad initium Novembris ; Hyemsque tota solito ficcior & calidior fuit.

Morbi qui durante calore apparebant, fuère febres putridæ, & continuæ remittentes & intermittentes, hæmorrhagiæ largæ spontaneæ, sanguinis expuitiones, ejusdem vomitiones, aliique ejusmodi. Mutato autem cœli temperamento per Frigoris accessionem, succedebant statim alvi fluores, vomitiones, intestinorum dolores, eorundem inflammationes, sanguinis per alvum excretiones, aliaque ejusmodi. Quæ  
omnia



omnia, redeunte aere ad priorem caliditatem, brevi cessabant. Qui Febribus supra numeratis hoc tempore laborabant, diarrhœis & torminibus multum vexabantur; ruebant enim humores, qui durante calore per sudorem fuerunt eliminati, summo cum impetu per alvum circa tempus Criseos, & prostratis viribus perierunt Ægri.

Cessante frigiditate, subitò redivit calida temperies, & adauctis viribus grassabantur febris putrida & continuæ remittentes. Hoc autem notatu non est indignum, quod paulo ante crisin ad Diarrhœas magis proni fuerunt Ægri, quàm ante Frigiditatis accessum; licet rarò per has vias judicata fuit febris (5).

QUÆST. 5. Annon subitanea Frigiditatis Accessiq, Fibras Corporis, præcipuè cutaneas, constringendo, & Humores ad partes interiores repellendo, ad effectum hunc producendum non parùm conducet?

Harum

Harum prior, viz. febris putrida, hoc annò primò in mense Maio, se palam faciebat, & in Julio ad ἀκμὴν pervenit, quo statu per totum Augustum duravit, ægrosque multos e medio sustulit.

Accessit hæc Febris cum rigore, nausæâ, vomitu biliosæ materiæ, alternisque frigoris & caloris reditibus. His conjunctæ fuerunt ingens lassitudo totius corporis, & sensatio quasi maximi ponderis humeros & dorsum comprimentis. His succedebant fitis & calor pungens, lingua arida & fusca, nonnunquam nigra. Ægri his symptomatibus plurimùm excruciiati, parùm dormiebant, non sudabant, continuò ferè delirabant. Anxietate & inquietudine summâ vexati, perpetuò se per lecta commovebant. Circa diem duodecimum non paucis oborta est Diarrhœa, vires prosterbens, symptoma-  
ta

ta rarò allevans; & hoc etiamfi in morbi accessu Emeticum sumpsissent ægrí, ut monet Sydenhamus. Rubebant enim plerumque humores talia copia ex improvísò per alvum, ac ægrorum viribus prorsus impar fuit. Aliò autem iis res successit, quibus lentè per totum morbi decursum alvus fluebat. Quamvis enim raro per has vias judicationem passa est febris, hos tamen minus urgebant calor, inquietudo & delirium; neque crisi obstabat talis evacuatio, quin potius, symptomata leniendo, citius induxit; quæ plerumque circa decimum sextum, ab initio febris, diem, exorto sudore morbum solvit.

Pulsus plerumque creberrimus fuit, rarò fortis; cutis aspera; urina rubra, & sedimenti expers; judicatâ autem per Diaphoresin febre, sedimentum fuscum deposuit.

Sanguis

Sanguis ex Venis in initio morbi missus admodum rutilus fuit & dissolutus, adeoque parte ferosâ commixtus fuit Cruor, ut sanguini ex Arteriis missô non fuit absimilis (6).

Horum quidam Ptyalismo per totum morbi decursum affecti sunt, qui omnes, quos ipse vidi, sanabantur, & reliqua symptomata aliis ægris mitiora habebant.

Hujusmodi symptomata robustos & exercitatos, præ cæteris, occupabant; qui vero laxi fuerunt temperamenti, imbecilles, Hysterici & cachectici, tremore, spasmis, & delirio affecti

QUÆST. 6. Annon Fluor hic Sanguinis naturali major, ab actione particularum Caloris, hoc in anno magis quàm aliis vigentium, oriri posset. Et annon ab eadem causa diathesin sanguini magis putridam induci necesse est? Annon etiam reliqua hujus morbi symptomata, dissolutum hunc sanguinem valdè acrem, & in extrema vascula plus justo impulsum esse demonstrant?

sunt;



sunt ; dum alii ob summam virium prostrationem, spirituumque dejectionem, quasi stupidi jacebant, urinas & stercore involuntariè emit- tentes ; exfuscitati tamen delirabant.

(7) In his, ultra vicesimum diem, plerumque protracta fuit Febris, quæ in paucis quibusdam, sine Crisi manifestâ terminata est ; his autem admodum tarda accidit Sanatio.

Variantibus hoc modo in Ægris diversis, symptomatibus, necessariò variationem subiit Medela. Hæc autem observatu non prorsùs indigna videntur.

In Ægris prioris generis, frigidi- ori Regimine & largiori Diluentium copiâ necessariò uti oportebat, quàm

QUÆST. 7. Annon Materiæ perspirabilis, majori copiâ hoc anno quàm aliis, Excretio, san- guinis & liquidi nervosi copiam ita diminueret, & indè in solidas corporis partes debilitatem in- duceret, ut in ægris hujusmodi hisce Symptoma- tibus ansam præberet ?

in

in iis, qui iisdem symptomatibus aliis annis laborabant. Et etiam ubicunque Alexipharmacorum usus necessariò postulabant ægrorum status, minor sufficiebat medicamento Dosis, quam vulgò exhiberi solet.

Pauci admodum ægri quamlibet Opii vel dosin, vel medicamentum ex eo confectum sine delirii incremento fumere valebant. Diacodiata tamen, & anodyna mitiora, plenâ manu, largâque diluentium copiâ exhibita, summo fuerunt ægrotis emolumento (8).

Præter Febrem jam descriptam grassabantur febres continuæ remittentes, præcipuè circa Autumni in-

QUÆST. 8. Annon hic effectus ad majorem hanc sanguinis dissolutionem meritò tribuendus, quàm opiata præ cæteris ferè omnibus promonent? Et annon indè patet, cur Diacodiata, Emulsiones, aliaque ejusmodi, quæ blandis & mucosis æquè ac soporiferis saturantur particulis, tanto essent ægris emolumento?

ritum

itium

itium, paulò post quod Tempus vel evanuit *Σύνοχος*, vel in remittentes commutatus fuit. Quod postremum quidem probabilius est; eo quod hæ Febres iisdem symptomatibus in morbi ingressu ægros afficiebant, quibus febris putrida; quæ tamen paucis elapsis diebus, per vices, licèt irregulares, remittebant. Paroxysmi acriores ut plurimùm fuêre, quàm vulgò in remittentibus inveniuntur, & frequentèr delirio comitati. Paroxysmis rarissimè præcedebant rigor & frigus febrile, etiam in iis ægris, quibus febris insultus certis rediit intervallis: Et quibus frigoris accessio quædam comitata fuit, brevi soluta est. Circa autem Hyemis initium in febres intermittentes, frigore leni comitatas, conversæ sunt; redeuntibus tam per *Æstiatem*, quàm per *Hyemem*, quotidie paroxysmis.

Hic

Hic annus majori Maniacorum numero comitatus fuit, quàm in annis communibus accidit, (9) aliofque omnes quos novi, tam in ægrorum numero, quàm symptomatum sævitie, superavit.

Annus  
1720

Annus subsequens, viz. 1720. majori Siccitate conjunctus fuit, quàm annis huic Insulæ communibus invenitur, caliditati tamen in proximo elapso nequaquàm æqualis erat.

Febres hoc Anno grassantes remittentes fuere & intermittentes ejusdem ferè generis, ac in anni prioris declinatione numeravimus. Per dies enim aliquos non remittebant, & delirabant ægri in Paroxyfms. In his autem iis dif-

QUÆST. 9. Annon Calor hujus anni major illo, qui huic Insulæ familiaris est, humores attenuando, liquida, lenia & aquosa exhalando, acrimoniam augendo, fibrasque corporis exsiccando, ad hunc effectum producendum non parum conducere?

ferre



ferre videbantur, quod certioribus temporis intervallis redierunt paroxyfmi, & tertianæ plerumque fuerunt febres, seu potius istius generis quod *ἡμιτεταῖον* appellant Græci; diu enim ægro durabant paroxyfmi, brevique redibant, nec unquam ex toto cessavit febris. Durante etiam paroxyfmo de ventriculi angore, ægritudine, & nausæâ magis conquæsti sunt, & vomitione frequentius affecti sunt, præsertim in initio paroxyfmi. Quæ symptomata duraverunt, quousque sudoris eruptio & iis & paroxyfmo finem imposuit. Hoc vero finito per paucas horas mitescebat vigor febris, & levamen aliquod ægris concessit, *ἀπυρεξίαν* tamen perfectam nequaquam experti sunt.

Sitis & Calor in hoc, quam anno proximè elapso, mitiores fuere; lingua primùm albescebat, dein fusca evasit. Paroxyfmi autem diù

D

dura-

durabant, & ad horas quadraginta non raro extenſi fuerunt.

Urina in remittentibus turbidior fuit & flavedine majori tincta quam in anno præcedente; & ſedimentum copioſum, ſubalbidum, ad flavedinem autem accedens, depoſuit. In intermittentibus lateritium fuit ſedimentum. (10) (11)

Præter has graſſabantur ſparſim febres quædam putridæ, anno præ-

QUÆST. 10. Annon ſtatus humorum corporis in hoc anno, febrem putridam ſuccedente, eorum ſtatui, in anno febrī Putridæ præcedenti, fuit quam ſimillimus?

QUÆST. 11. Annon igitur Siccitas & Calor duorum annorum febrī putridæ præcedentium, adeo humorum acrimoniam & putredinem augerent, ut loco Remittentium in ægris quibuſdam πυροχόιν producerent; eoque præcipue, cū eādē ratione increvit Calor & febris Putrida, cū ſummo durante Calore maxime graſſabatur, & diminuto calore ſenſim evanuit? Et annon tam ex his, quàm ab animalibus in aere ſicco & calido diu retentis, effectus talis temperiei in humoribus putrefaciendis, & teterrimis morbis producendis, ſatis patet?

cedenti

cedenti descriptis mitiores, frequentius tamen languidæ & nervosæ, quæ vertigine, stupore, & nervorum tremoribus conjunctæ, eos, præ cæteris, occupabant qui laxi, imbecillis, & hysterici fuerunt temperamenti. Hæ febres Pulsu celeri & debili; Urinâ tenui, pallidâ & crudâ, & nonnunquam Diarrhœâ conjunctæ sunt. Horum Linguae plerumque subalbidæ fuerunt, raro siccæ; neque multùm sitiebant Ægri; Sudoribus tamen partium quarundam singularium valdè fuerunt obnoxii, maximè circa capitis, cervicis, & thoracis regiones. In his duravit febris usque ad vicesimum diem, aliquando diutiùs, & exorto sudore per totum corpus, ut plurimùm, judicata est: In quibusdam tamen in intermittentes convertebantur. His plurimùm proficiebant vesicatoria,

D 2      cardiaca,

cardiaca, & diaphoretica. (12.)  
(13.) (14.)

Annus  
1721.

Annus subsequens, viz. 1721, admodum fuit humidus, frigidus, pluviosus, præsertim in mensibus æstivis, spirantibus ventis ex plagis borealibus.

QUÆST. 12. Annon Calor duorum annorum prægressorum, vasculorum perspirabilum ora nimis laxando, & humores colliquando, ad sudores hos partiales producendos, conducere; eoque præcipuè, quod eas Corporis partes, præ cæteris occupabant, quibus sanguinis impetus & fluiditas maximo gradu vigent?

QUÆST. 13. Annon etiam hinc patet ratio, cur hujusmodi febres multò frequentiores in Æstate, quàm Hyeme inveniuntur? Et annon indoles Febris in anno 1716, cutis asperitate & siccitate, cruoris inflammatione, aliisque symptomatibus ejus anni Diagnostice, conjunctæ, ex frigidity Hyemis in 1715, aliquo gradu penderet?

QUÆST. 14. Annon, summum ab Epispasticis oriens emolumentum in morbis hujusmodi inde producitur, quod sanguinem attenuando vasa nimis repleta reficiunt, vi sua stimulatoria vasorum tunicas ita constringunt, ut conservetur inter solida & fluida æquilibrium, & inde liquidorum motum ferè amissum instaurant?

Hæc



Hæc aeris temperies usque ad initium *Septembris* duravit, ex quo, usque ad *Novembris* initium, tepidum & placidum fuit cælum; Hyemisque tota lenis erat, & paucò gelu comitata.

Febres hoc anno grassantes, etiam si ad intermittentium classẽm pertinebant, ab iis anni prioris differebant; eo quod Frigore majori & longiori, Calore leniori & breviori comitatæ erant; Ἀπυρεξία etiam perfectâ in paroxysmorum intervallis fruebantur ægri & in paroxysmis non delirabant; alvi tamen Fluoribus magis erant proclives. Urina etiam Rubedine majori tincta fuit, & sedimentum lateritium deposuit.

(15)

QUÆST. 15. Annon major aeris humiditas & frigus, in hoc, quàm anno præcedente, viscositatem majorem, minori acrimoniâ conjunctam, humoribus inducerent; & inde mutationes has in his febribus producerent?

D 3

Præter

Præter has apparebant febres quædam lentæ nervosæ, virium collapsu, spirituum dejectione, stupore & surditate conjunctæ, iisque anno præcedenti grassantibus non abfimiles; nisi quod ægri parùm sudabant, & rarò crisi ullâ sensibili terminatæ sunt hæ febres, sed post toleratum morbi decursum diuturnum, ægri sensim convalescebant, & pauci perierunt. (16)

In mense *Aprili* grassari incipiebant Morbilli & per totam *Æstatem* permanebant. Moris pelrumque fuerunt maligni, tussi continuâ, spirandi difficultate & pulmonum inflammatione conjuncti.

QUÆST. 16. Annon absentia sudorum partialium, ab iis aeris mutationibus pendere posset, quæ in Quæst. præcedente numerantur? Et etiam annon ex eâdem causâ oriri potest, quod sudoribus, ut in anno priori, hæ febres non æquè fuerunt judicatæ?

Vernalis

Vernalis tempeſtas Anni 1722, <sup>Annus</sup>  
admodum fuit frigida, aquoſa, plu- <sup>1722.</sup>  
vioſa, variisſque ventis turbata, præ-  
cipuè tamen ab iis, qui ex plagis  
ſeptentrionalibus & orientalibus pro-  
veniunt. Duravit hæc aeris conſti-  
tutio uſque ad medium æſtatis, eo  
modo, ut totum æſtatis initium ma-  
jori frigore fuit comitatum, quam  
vulgò in iſto anni tempore accidere  
ſolet. Morbi in hujus tempeſtatis  
initio graſſantes, fuere pleuritides  
quædam & angina, non admo-  
dum autem frequentes; præ cæteris  
tamen graſſabantur febres intermit-  
tentes tertianæ, inter quas appare-  
bant quædam Quartanæ, præſertim  
in iis ægris qui frequentèr in Terti-  
anas illapſi ſunt.

Non æquè felici ſucceſſu febres  
has jugulavit Cortex Peruvianus, in  
hoc anno, ut in aliis novi, ob alvi  
fluxus frequentèr ejus uſui ſuperve-

nientes. Et cum nullum hujusmodi accidit impedimentum, medicamenti vires non rarò elusit Febris; alexipharmacis tamen & diaphoreticis conjunctum feliciori successu exhibitum fuit Pharmacum. (17)

Emetica & diaphoretica frequenter repetita, plurimis fuerunt ægris emolumento; quorum usu non pauci sanabantur, postquam medelæ methodos magis usitatas elusissent vires febris. (18)

Præter hos autem alvi fluxus febres intermittentes comitantes, a Diarrhœis solis vexati sunt aliqui:

QUÆST. 17. Annon frigiditas & humiditas aeris, in hoc, quàm priori anno majores, humorum viscositatem augendo, & vasa infarciendo perspirabilia, in causis sint, quod febres remittentes anno priori descriptæ, in has Intermittentes converterentur? Et annon hinc patet ratio, cur medicamenta calefacientia cum Cortice exhibita, vires ejus augerent?

QUÆST. 18. Annon hujus ratio ex Quæstione præcedente satis patet?

Hæ

Hæ tamen neque sanatu erant difficiles, nec quicquàm observatu dignum in symptomatibus habuerunt.

Intermittentes hunc & priorem annum comitantes, prout ante memoravi tertiani plerumque fuerunt generis; circa autem hujus Autumni finem, in Quartanas non paucæ commutatæ sunt; quæ postquàm per totam hyemem frequentibus morbi reditibus ægros excruciaffent, vere sequenti prorsùs evanuêre. (19)

Hyems hæc acris fuit & sicca, spirantibus, præ cæteris, ventis orientalibus & septentrionalibus, præcipue circa finem; qui status aeris per

QUÆST. 19. An febres intermittentes quartanæ ab aliis febribus intermittentibus naturâ & essentiâ sunt diversæ, ut quidam hallucinati sunt? Et annon potius a majori humorum viscositate, vasorum infarctione, & torpidiore fibrarum vibratione petendæ sunt horum morborum differentiæ?

totam



totam tempestatem vernalem duravit.

Quamvis autem morbi Epidemici supra descripti præ cæteris omnibus grassabantur, Sporadici tamen & Intercurrentes non pauci apparebant, ut etiam ii, qui ab anni tempestatibus certo quodam modo pendent, & Vernale & Autumnale tempus comitantur; qui quidem omnes morbi, etiamfi ab Epidemicis tum regnantibus in initio longe discrepantes videbantur, paucis tamen elapsis diebus, & præcipue præmissis generalibus Evacuationibus, in Epidemicos regnantes terminati sunt; & ratione habitâ ad symptomatum principalium varietatem, eodem modo sanabantur, Hoc autem præcipuè accidit duobus annis proximè elapsis, quibus grassabantur febres intermittentes Tertianæ, quarum paroxysmi certioribus intervallis, quam  
in

in annis præcedentibus redierunt. Unde forsàn accidit, quod in his non solùm clariùs patebat hic morborum in se mutuò transitus ; quin etiam, quod breviori temporis spatio, naturam eorum latentem ita palam fecerunt, ut ad intermittentium classẽ certius reduci possent. (20)

Frequentes horum morborum reditus, multos, eosque pertinaces Morbos, visceribus induxerunt, præcipuè inter Plebem, ubi desit vel cura morbi, vel medendi opportunitas. Hos præ cæteris morbis af-

QUÆST. 20. Annon itaque grassante febre qualibet Epidemicâ, symptomata aliarum febrium tunc temporis apparentium cum epidemico regnante diligentèr sunt comparanda, & quantum indolis epidemicæ in se habeant feriò perpendenda ? Quippe cùm ex statu aeris prægresso, vel præsentì, plurimum pendent, qui utrisque communis est, fieri non potest, quin in multis ad morbi essentiam pertinentibus, sibi mutuo congruant ; etiamsi specie diversi nonnunquam appareant.

ficiebant

ficiebant hydrops, icterus, & phthisis, & præcipuè ista hydropis species, quam Asciten nominamus, de quo morbo plures circa hoc tempus quam in omnibus prægressis aeris temperamenti simul sumptis ægrotarunt, cujus effectus rationem, ex lenta liquidorum in hoc morbo Diathesi, laxâ viscerum & vasorum abdominalium texturâ, & ingenti liquidorum copiâ vi febris hic adaكتورum, satis docet Hydraulices. Hinc patet eorum Error, qui Corticem Peruvianum, quasi præcipuam horum morborum causam, in his ægris, damnant; eò quòd, non solum diù ante quàm notum est hoc Pharmacum, tales morbi diuturnis intermittentibus succedebant; quinetiam quòd hoc tempore eos præ cæteris infestabant, qui Corticem vel non omnino, vel minimâ tantùm copiâ sumpsisent, ejusque defectu intermittentium infultus

sultus diutiùs sustinuiſſent ; dum e contra ægri, quibus ejus ope cito profligata fuit febris, immunes plerumque manebant. Dari quidem caſus, etiam in intermittentibus, quibus vel ex toto, vel ſaltem pro tempore, parum convenit hoc remedium, nemo eſt qui non novit ; cur tamen imperitè præſcribentis ſemper pœnas luat nobile Pharmacum non æquè patet.

Æſtas proximè ſubſequens, viz. Annus 1723.  
Anni 1723, admodum fuit ſicca,  
Calore tamen ſiccitati proportionali nequaquam fuit comitata : Eo quod radii ſolares plerumque nubibus fuerunt obducti, & aeris calor ventis ſeptentrionalibus, & orientalibus, præcipuè tamen poſterioribus, erat refrigeratus.

Hæc aeris temperies per totum Autumnum ſubſequentem, & Hyemis initium, ratione habitâ ad neceſſarias

cessarias tempestatum variationes perdurabat ; adeò ut tota hæc temperies, quasi temperamentum aeris Orientale, majori Siccitate, & caliditate minori, quàm vulgò accidit, conjunctum, meritò æstimari debet.

In tempestate vernali grassari incipiebant Variolæ, & per totam æstatem duraverunt ; confluentes plerumque fuerunt & moris maligni, & in nonnullis maculis purpureis comitata. Hæc nil novi quod addam earum historiæ exhibuerunt, nisi notatu dignum sit, quod ægri qui modico & spontaneo alvi fluore per totum morbi decursum afficiebantur, symptomatibus lenioribus, ut plurimum, laborabant ; Et ubicunque deficiebat hic alvi fluxus, medicamenta antiphlogistica alvum laxantia, clysmata diluentia, aliaque similia, hujus defectum felici successu suppleverunt,



& symptomatum maxime urgentium remissione fuerunt conjunctæ; ob diminutam forsan inflammationem, suppurationem, aut copiam pituitæ crassæ respirationem impediētem.

Jure quidem horrent medici diarrhœam vires prosterntem, ptyalismum sistentem, faciei & extremorum tumefactionem impediētem; hunc vero effectum a tali alvi solutione ortum, me nunquam observasse memini, sed e contra, Juvenibus sanguinolentis, ætate & viribus florentibus, hanc praxin sæpe utilem novi; dum immanes febris insultus ab alvo, in morbi decursu, pertinaciter astricta, turgentem humorum colluviem intus retinente, non raro productos vidi: Imo lethales alvi fluores, quibus astricto ventre, occurrere conantur medici,  
hinc

hinc aliquando ortos fuisse, non levis mihi incidit suspicio. In tali quippe corporis statu, accedente, a causa quacunque, stimulo lenissimo intestinorum tunicas vellicante, pleno rivo, quàm datur porta, summo cum ægri periculo, expelli humores necesse est. Locum præcipuè habere videtur hæc praxis eo morbi genere, eove stadio quo nimis viget, aut plus justo crescit inflammatio, cum pro hujus ratione in morbi decursu, cætera leniora, vel graviora fieri, symptomata, res ipsa clamat.

Doloribus etiam pleuriticis & acerrimorum nephriticorum æmulis ante pustularum eruptionem non pauci afficiebantur variolosi ; & sanguis ab ipso morbi initio non parùm fuit inflammatus, in quo morbi stadio, rarò a statu naturali, sensi-

sensibilis patet cruoris deviatio.

(21.) (22.) (23.)

Cæteri

QUÆST. 21. Annon Ptyalismus, adeo in variolis confluentibus apprimè utilis, ut ad sanitatem recuperandam omninò necessarius a Sydenhamo æstimatur, Effectus hos salutiferos, vasa sensim deplendo, maximâ ex parte producit, quæ aliter a diminuto perspirabili, & repulsa humorum colluvie, opprimerentur? Annon itaque ubi deficit naturalis hæc evacuatio, methodus supra descripta, quæ certiùs ptyalismo voluntati nostræ subjicitur, hujus defectum gradu quodam supplere possit; eoque præcipuè, cum vel nimis citò cessat, aut in stadio morbi a naturâ destinato, non apparet hæc evacuatio?

QUÆST. 22. Cùm ii hujus morbi furorem aliis felicius effugiunt, qui circa faciem & cervicem paucioribus Pustulis obsiti sunt, utcunque in corporis Trunco externisve membris numerosæ sint pustulæ; Annon in initio morbi multum conducerent, partium inferiorum Balneationes, tepidæ suppedalia stimulantia, aliaque similia; quorum ope magis implentur vasa inferiora, & vi stimulatoriâ major fit ad has partes derivatio?

QUÆST. 23. Cùm resorptio puris in venas, vel ortum febris secundariæ præbet, vel saltem ejus sævitiem plurimùm adauget; Annon urgente morbi necessitate, pustulas aperire, & liberio-

E

rem

Cæteri morbi hoc anno grassantes, fuere pleuritides, anginæ, rheumatismi, aliique ejusmodi morbi partium quarundam inflammatione conjuncti. Multi etiam stranguria & urinæ difficultatibus, aliique tussi perpetuâ, ex sero tenui, & acri orta vexabantur, quod expectorationis ope frustrâ ejicere conabantur. Phthisici etiam & asthmatici plurimum hoc anno passi sunt, & perierunt in Autumno multi; augebantur enim admodum tussis, febris hæctica, aliaque ex his orientia symptomata; præ cæteris autem sæviebat Tussis, & ægros hos vacillantes miserrimè torquebat.

rem materiæ purulentæ exitum conciliare, eosque abscessus more Chirurgico tractare conveniat. Quâ Methodo non tantum diminuetur ipsa febris, quin etiam eæ corporis partes, quæ, præ cæteris, hujus morbi sævitiam patiuntur, citissimè levare possunt, tam a præsentī, quam futura per tot emunctoria, evacuatione materiæ?

Pulsus

Pulsus in morbis inflammatoriis creber fuit & durus, Cutis tensa & rigida, & Sanguis majori ratione inflammatus, quàm in aliis annis frequenter accidit. Neque laborabat quisquis ex quocunque ferè Morbo, præsertim si dolore vel minimo torquebatur æger, quin sanguis Crustâ inflammatoriâ obductus fuit.

Ægri, præ cæteris omnibus, largâ sanguinis missione levabantur, neque aliam quamlibet medendi methodum felici successu coronatam, omisâ sanguinis missione, me observâsse memini.

Venter plerumque astrictus fuit, Evacuationes autem per Alvum sine missione sanguinis institutæ, non solum ad sanationem parùm contulerunt, sed frequenter symptomatum sævitiam, præsertim in rheumatismis, augebant ; diminutâ autem a  
E 2 sanguinis



sanguinis missione morbi violentiâ, ægris non parùm profuerunt.

Balnationes tepidæ, præmissis evacuationibus, plurimis fuerunt emolumento, præsertim rheumaticis; Quibus autem vel prorsùs defecerunt hujusmodi evacuationes, vel parcâ nimis manu applicatæ sunt, symptomatum sævitiem augebat Balneatio; repetitis autem evacuationibus, sensim decreſcebant dolores, & ægris non parùm profuit. (24.) (25.)

Hic status fuit aeris & morborum eum comitantium, durante æstate;

QUÆST. 24. Annon incrementum hoc doloris ex balneatione inde producitur, quod calore balnei augebatur sanguinis impetus, solvebatur magis cruoris textura, & inde spatium magis amplum postulabat sanguis?

QUÆST. 25. Annon itaque in horum morborum initio, præ cæteris omnibus, profunt Evacuationes, & pariori manu, saltèm quousque satis depleantur Vasa, adhibenda sunt medicamenta sanguinem attenuantia? quippe aucto Dolo-  
re, augeri Inflammationem necesse est.

accedente

accedente tamen in autumno frigore subitaneo, augebatur ægrorum numerus, & grassabantur frequenter diarrhœæ, dysenterix, & intestinorum inflammationes; quæ omnia sine largâ sanguinis Missione non sanabantur, & ratione habitâ ad partium affectarum differentiam, eidem methodo, ac morbi in Æstate descripti, se subiciebant.

Duravit adhuc siccitas, & usque ad medium *Novembris* porrecta est, circa quod tempus decidebant pluvix largæ continuæ, & Hydrargyrum, quod durante siccitate altissimè perstitit, duos circiter Pollices descendit.

Hæc aeris variatio, etiamsi diù non permanfit, largiori ægrotantium numero ex morbis descriptis conjuncta fuit; præ cæteris autem grassabantur pleuritides, rheumatismi, & dolores arthritici.

Pulsus creber fuit & durus, & sanguis eo gradu inflammatus, ut crusta inflammatoria Cruoris superficiei innatans, dimidiæ ejus Quantitati haud rarò æqualis erat.

Hic major morborum inflammatoriorum numerus hoc tempore, quam Æstate præcedente, a subitanæ fluidorum expansione, & tenfiori fibrarum texturâ, non improbabiliter ortum duxit. Cùm enim fluida viscositatem quandam inflammatoriâ, a prædictâ aeris temperie acquisivissent, solidæque corporis partes rigiditatem naturali majorem a siccitate induissent; diminutâ aeris incumbentis pressurâ, in extrema Capillarium vascula impetu ferri, ibique ob canalium angustias obstructions & inflammationes producere necesse est. Quod quidè a summo levamine ægrotis profluente ex sanguinis missione, iisque medendi

medendi methodis, quarum ope diminuebatur sanguinis impetus, solvabatur viscositas ejus inflammatoria, & laxiores fiebant vasorum tunicae, ulterius patet.

An autem his, vel aliis cujuscunque generis causis tribuendi sunt hi morbi, hic non contendam : Hoc autem pro certo ponam, sanguinem non solum majori ratione in hoc Anno inflammatum fuisse, quin etiam Morbos cujuscunque generis inflammatorios frequentiores, & accriores, quam in Annis prioribus, productos fuisse. (26.) (27.) (28.) (29.)

### Redeunte

QUÆST. 26. Annon partium solidarum major rigiditas, & fibrarum frequentiores vibrationes a siccitate ventisque his mordacibus & constringentibus productæ, sanguinis velocitatem augendo & canales coarctando, inflammatoriam hanc viscositatem adeò Epidemicam cruori inducerent; Eoque præcipuè, cùm status hic san-

Redeunte post tres circiter hebdomadas sicca aeris temperie, eodem statu usque ad Æquinoctium vernale duravit cœlum, & grassaban-

guinis morbos ferè omnes dolore conjunctos comitatur, cujus ope coarctantur vasa, frequentiores fiunt villorum tremores & velocitas sanguinis major?

QUÆST. 27. Cum Viris exercitatis, robustis & Senibus pejores sunt variolæ, ob nimiam fibrarum rigiditatem & humorum acrimoniam; & è contrà, in puerulis, mulieribus, laxis, & imbecilibus plerùmque exitus sunt felicioris; Annon Constitutio hæc aeris inflammatoria vasa coarctando, & humorum acrimoniam augendo, variorum prædictarum sævitiam plurimùm auget?

QUÆST. 28. Annon itaque Variolæ præiisitivâ productæ, pro varietate regnantis Epidemici necessario mutationes subeant, & lenioribus vel acrioribus symptomatibus, hac ex causâ erunt conjunctæ? Et ideo, an in omni aeris constitutione, annove quolibet, Prophylaxeos gratiâ tentanda hæc Methodus?

QUÆST. 29. Annon etiam balneationes tepidæ totius corporis frequenter repetitæ, victus humidus laxans & acrimoniam obtundens, diu ante insitionem continuata, ad exitum felicem procurandum apprimè necessaria?

tur



tur morbi inflammatorii, præcipuè Rheumatismi, numero tamen pauciores.

Circa Æquinoctium autem aeris temperies, communi more, inconstans fuit & variabilis, imbribus & Cælo sereno se mutuò per vices recipientibus. Apparebant hæc tempestate Anginæ quædam & Pleuritides, iis tamen in Anno priori grassantibus longè mitiores.

Æstas Anni 1724 frigida fuit & pluviosa, permanentibus ventis plerumque in plagis quibusdam septentrionalibus. Stetit Thermometrum solito inferius, ratione habitâ ad anni tempestatem; mansit enim Spiritus plerumque circa gradum 45, & rarò ultra 40 affurgebat.

Annus  
1724.

Circa Autumni medium placidum & serenum fuit cælum, spirantibus ventis plerumque ex plagis australibus & occidentalibus; quæ cæli  
facies

facies usque ad Hyemis initium duravit. Circa hoc tempus acre Gelu infecutum est, quod per hebdomadam duravit.

Hunc aeris statum consecuta est tempestas admodum humida, & pluviosa, quæ usque ad initium *Januarii* porrecta est; spirantibus fere perpetuò ventis ex plagis septentrionalibus, ideoque totus hic Annus humidus, & frigidus meritò æstimari debet.

Durante Vere & Æstate tempestas saluberrima fuit, pauci apparuerunt morbi, iique boni moris; quæ aeris salubritas usque ad Autumni finem porrecta est. Circa hoc tempus multi torminibus & alvi fluoribus laborabant, largæque nonnullis per alvum accidebant hæmorrhagiæ. Accedente autem Gelu redibant rheumatismi. & multos occupabant.

Sanguis in rheumatismis, aliisque morbis inflammatoriis, non æquè,  
hoc

hoc Anno ac priori, inflammatus fuit, crustâ minori obductus fuit cruor, & medicamenta purgantia feliciùs votis respondebant (30.)

Cæteri morbi febriles, qui præter eos jam enumeratos apparuerunt, pauci fuerunt, frequenter autem diarrhœis erant comitati, & non raro per has vias judicati.

Hoc autem ex indole morborum in toto hoc Anno apparentium summatim colligi potest; quod evacuationes, quæ per alvum fiebant, non solum feliciùs voto respondebant, quin etiam quod minori medicamenti cathartici dosi solvebatur alvus. (31.)

### Appa-

QUÆST. 30. Annon minor cruoris inflammatio in hoc anno, quo villorum tremores, ob majorem aeris humiditatem, necessariò torpidiores, quàm in priori evaderent, Quæstionem (26) aliquo gradu stabilit?

QUÆST. 31. Annon aeris in hoc Anno major humiditas, materiæ perspirabilis copiam diminuendo,

Apparebant etiam hoc anno variolæ, Pustulæ tamen plerumque fuerunt discretæ, paucæ, & moris benigni. (32.)

Temperies aeris in *Januario* Anni 1724. fuit tepida, placida, & serena, ratione habitâ ad anni tempestatem, spirantibus, ut plurimum, ventis ex plagis australibus, & occidentalibus; quæ aeris temperies, paucis exceptis diebus, usque ad *Aprilis* medium duravit.

Apparuerunt hoc tempore quædam pleuritides, & rheumatismi,  
pauci

minuendo, in causâ sit, quod impetu majori per Alvum corruerent humores, & sæpius quàm priori Anno hoc modo judicatæ sint febres? Et annon ex eâdem Causâ oriri possit, quod ad Catharsin procurandam, minor quàm in Anno præcedenti, sufficiebat medicamentorum dosis?

QUÆST. 32. Annon Constitutio hæc aeris, Indoles variolarum, & aliorum morborum hoc Anno apparentium, cum iis Anni prioris comparatæ, Quæstiones 27, 28, 29. aliquo saltem gradu probant?

pauci tamen alii febriles morbi. Sanguis in omnibus his inflammatus fuit, & pleuriticorum æmulus.

Circa medium *Februarii* apparebant febres quædam remittentes & intermittentes, majori sanguinis inflammatione conjunctæ, quam vulgo hos morbos comitatur; Fuit enim plerumque cruor, Pleuriticorum more, pelliculâ inflammatoriâ obductus. Materiem etiam Biliosam largâ copiâ, tam per vomitum quàm per alvum, summâ cum ægritudine ejiciebant ægri. Quæ ambo symptomata sanguinis missione præ cæteris levabantur remediis.

Hi morbi *συνόχων* in initio speciem præ se ferebant, paucis autem elapsis diebus, præcipuè post missionem sanguinis, vel in *συνεχεῖς*, vel intermittentes conversi sunt.

Quamvis autem hi morbi ad intermittentium classem meritò applicandi



candi sunt, proclivitas non levis iis inesse videbatur, ut in *συνόχῃς* transirent : Eo quod, singuli Paroxyfmi, etiam in iis qui perfectè intermittebant, citatiori pede & symptomatibus acrioribus, quàm priores redibant.

Dum febres hæ fuerunt continuæ, Urina rubra fuit, & sedimenti expers ; cum autem in intermittentes convertebantur, Sedimentum ingens, majori rubedine quàm vulgo videmus tinctum deposuit.

Qui Corticem Peruvianum in initio morbi, etiam in intermittentibus, neglectis evacuationibus, & præ cæteris sanguinis missione sumpserunt, symptomatum sævitatem adauctam habebant ; qui verò in remittentibus pharmacum hoc temerè sumpserunt, paroxyfmo sequenti frequenter delirabant.

Initio mensis *Martii*, & circa ejus finem decidebat paululum nivis

&c

& subsidebat thermometer hoc tempore decem circiter gradus, spirantibus ventis septentrionalibus & orientalibus.

Circa hoc tempus grassabatur tussis pertinax convulsiva, præsertim inter infantes, & per totam æstatem subsequenter duravit.

Circa medium *Aprilis* anni 1725, Annus  
1725. tempestas admodum frigida fuit & pluviosa, ratione habitâ ad anni tempus, eodemque modo, paucis exceptis diebus, per totam Æstatem & Autumnum, imo usque ad medium *Decembris* duravit, & hoc gradu longè majori, quàm in quolibet annorum prædictorum.

Cùm autem circa hoc tempus egomet morbo gravi & diuturno correptus sum, qui per quatuor Menses me ab hujusmodi observationibus detinuit, de morbis in hoc intervallo apparentibus nihil est quod deponam

ponam; nisi hoc observatu dignum  
judicetur, quod tota hæc Æstas, non  
obstante summâ ejus Humiditate,  
fuit prioribus salubrior. Et reverâ  
tempestates humidæ valdè ficcis &  
calidis, plerumque salubriores inve-  
ni, exceptis circa humiditatis initi-  
um paucis hebdomadis, quæ  
tempestatem ficcâ immediatè secu-  
tæ sunt. Quod quidem phænomen-  
on, potius effectibus ficcitatis præ-  
gressæ, & mutationibus in OEcono-  
mia Animalium a variato aeris pondere,  
aliisque similibus causis brevi cessan-  
tibus, quàm ad humiditatis præsen-  
tis actionem tribui videntur; eo quod  
manente humidâ aeris Temperie,  
brevi diminutus est ægrorum nu-  
merus. An autem hoc semper sic  
se habeat, affirmare nequeo; pro-  
babile enim est, quod transeunte  
diuturnâ tempestate ficcâ subito in  
humidam, vel humidâ in ficcâ,  
vario

vario licèt modo, æquè affici corpora nostra ; & hoc præcipuè pro ratione caloris aut frigoris ; nisi forsan constans hujus insulæ humiditas, talem temperiem, nostris corporibus magis congruam, per assuetudinem, reddat.

In autumno apparuit febricula, ægritudine, nausæâ, & vomitu commitata, quibus succedebant pruritus molestus & eruptiones quædam cutaneæ ; elapsâ tamen hebdomadâ terminata est, & sequebatur icterus, & in quibusdam tumores pedum œdematosi.

Circa hoc etiam tempus apparebant Peripneumoniæ quædam, febre lentâ, spirandi difficultate magnâ, pulmonum gravitate, alvi Fluore, expectoratione difficili, pulsuque debili & inæquali conjunctæ ; Sanguis parum fuit inflammatus, Urina  
Fævus, & flavescibat

flavescebat, & parum sedimenti deposuit.

Hoc etiam notatu dignum est, quod ex quocunque morbo circa hoc tempus quisquis laborabat, vertigine, torpore, somnolentia, capitis gravedine, & non raro Aurium hebetudine conquestus est æger (33.)

Circa finem *Septembris* apparebant morbilli, moris autem benigni, & per totam hyemem duraverunt.

Incipiente *Januario* accidebat accegelu, nive multa conjunctum, & fuit tempestas admodum frigida & gelosa, stante tum Thermometro ad gradum 85; quæ cœli temperies ad finem mensis porrecta est, durante gelu iidem fere morbi ac in hyeme

1715

QUÆST. 33. Annon a diminuto perspirabili auctâ vasorum plenitudine, laxo solidorum statu, motuque fluidorum inertî, quæ ab hac aeris constitutione necessariò producuntur, patet horum effectuum ratio?



1715 apparuerunt, ut & circa ejus dissolutionem.

Fuit æstas hujus anni, prout ante notavi, non obstante summa ejus humiditate admodum salubris, ut etiam fuit hyems, pauci enim apparebant febriles morbi, exceptâ tantum tempestate gelosâ. Hoc autem per totum annum observare licebat, quod qui labe aliqua hypochondriaca & melancholica affecti sunt, non solum effectus diuturnæ hujus humiditatis hoc tempore senserunt, sed symptomata Verè sequenti multum adaucta habuerunt.

Morbi inflammatorii tempestatem gelosam comitantes, paulo post gelu solutionem evanuerunt, manebant tamen alii quidam, qui ante frigidam tempestatem apparuissent, & usque ad vernalem porrecti sunt; qui tam ab humiditate æstatis prægressæ, quàm hyemis frigiditate ori-

ri videbantur; qualis fuit peripneumonia quædam notha, febre lenta, pulsu molli, & spirandi difficultate magna conjuncta.

Hic morbus senes cachecticos, otiosos, & pituitosos maximè invasit, & eos horum præ cæteris, qui victu pleno, potu generoso, & præcipuè cerevisiis fortioribus liberè se indulgissent. Iique horum qui hunc morbum non passi sunt, tussi pituitosa & gravedine plerumque laborabant. *Juniores* simili modo ægrotautes ut plurimum vel leucophlegmatici fuerunt vel labe aliqua hydro-pica aut asthmatica affecti.

Horum pauci sanguinis missionem largâ copiâ ferebant, hunc tamen mitti plerumque postulabat morbus, aliter felici successu vix exhiberi potuerunt medicamenta dissolventia, incidentia, & expectorantia. In his enim exhibendis non levis requisita fuit

fuit cautela, ne vel nimio motu incitati humores, in pulmonum vascula impetu corruerent, ipsumque malum augerent: Vel e contra materies hæc viscida & pituitosa debito tempore, & copia satis larga, non excerneretur, liberque per pulmonem fieret sanguinis transitus. (34.)

Duravit tempestas gelosa usque ad finem *Januarii*, eique solutæ, succedebant pluviae frigidae, nix, & gelu, vicibus alternis se excipientia; spirantibus plerumque ventis ex plagis australibus, tam durante gelu prædicto, quàm tempestate hac variabili; quæ cœli temperies fere ad finem *Februarii* extensa est.

QUÆST. 34. Annon laxata ab Humiditate vasorum pulmonalium textura, horum diminuta perspiratio, & minor vesicularum inflatio in causa sint, cur difficilior per hoc viscus transiret sanguis, ejusque vasa lentore viscido gradu aliquo illineret; unde accedente frigore vasa magis coarctante, hoc viscus præ cæteris male se haberet?

Morbilli per totam tempestatem frigidam durabant, & circa hoc tempus, finem scilicet *Februarii*, quo calidior fuit aer, majori spirandi difficultate, tussique magis quàm antea pertinaci, & non raro doloribus pleuriticis, & alvi profluvio comitati sunt. Hæc autem symptomata maximè sanguinis missione, nonnunquam vero vesicatoriis præ cæteris, debellata sunt remediis, ratione habita ad lentiolem, seu acriorem febris comitantis decursum, aliamque medelam, exceptis diluentibus lenibus, vix postulabant. His autem neglectis, aut fero applicatis, duravit spirandi difficultas, & urgebat pertinaciter tussis, amotis omnino morbillis, multosque infantes in febrem hecticam phthisinque insanabilem præcipitarunt (35.)

Circa

QUÆST. 35. Annon insueta tussis pertinacia & dolores laterum ei supervenientes, tempestatis præce-

Circa finem *Februarii* cælum ferenum fuit & placidum, & fenfim, pro ratione veris appropinquantis, augebatur calor ufque ad *Æftatis* initium.

Menfe *Maio* anno 1726, aeris Annus  
1726. temperies calida fuit & ficca, paucis ventis perflata, iisque ex plagis australibus & occidentalibus tantum spirantibus.

Circa hoc tempus apparebant febres quædam remittentes & intermittentes, præcipuè verò priores, in multis pruritu & eruptionibus cutaneis conjunctæ; quæ aliis etiam ægris febribus nullo modo affectis, accidebant. *Ægroti* fere omnes, hoc

præcedentis asperitati merito tribuenda; eo quod horum ope subito stringebantur, præ cæteris, tracheæ, pulmonis, & partium contiguarum vascula, unde diminuto frigore turgerent horum humores; fibras vellicarent, & hæc symptomata producerent?

F 4 tempore



tempore febricitantes, vel cephalalgia acuta, vel capitis gravedine conquesti sunt, & ad delirium & phrenitidem ex levissimo errore admodum proni fuerunt (36.)

Hanc aeris temperiem morbi etiam aliqui inflammatorii comitati sunt, ut pleuritides, peripneumoniæ, anginæ, sanguinis expuitiones, alique ejusmodi; præ cæteris tamen, capitis dolores & oculorum inflammationes, circa hoc tempus, plurimum grassabantur.

Neque forsan observatu indignus censeatur effectus ille, quem in hypocon-

QUÆST. 36. Annon præcedentes aeris temperies humorum copiam, acrimoniam, & resistantiam ad corporis superficiem augendo, & cerebri vasa sensim implendo, turgentibus a vernali calore humoribus, ad hoc symptoma conducerent? & annon tam a prædictis phænomenis, quàm a cerebri & Meningum structura, cursuque sanguinis per has partes naturali, patet hujus conjecturæ veritas?

pocondriacos & melancholicos anno priore memoratos, produxit hæc tempeſtas, quorum multi levati ſunt, alii vero ſymptomata adaucta habebant, aliique mania correpti fuerunt (37.)

Effectus hi diverſi tempeſtatis hujus calidæ & ficcæ, prout mihi obſervare licebat, vel a variis mali ipſius gradibus, vel ægrorum temperamentis, calidis ſcilicet & ficcis, vel frigidis & pituitofis oriri videbantur. Cum enim morbus adhuc recens, obſtructionibus diuturnis non comitatus, ægerque non admodum pituitofus fuit, aucto ſenſim calore ſolvebantur humores, ad functiones ſuas perficiendas habilius evaſit

QUÆST. 37. An morbi hic obſervati, effectus hujus tempeſtatis in hypochondriacos & melancholicos, & eruptiones cutaneæ ſupra memoratæ, quæ hæc vaſcula gradu aliquo obſtructa denunciant, quæſtionem præcedentem non probant?

evafit corpus, & meliores fe habebant ægroti. Iis autem, quibus altis radicibus hæfit malum, nec hujus ope fuit fuperabile, augebatur fanguinis rarefactio, turgebant humores, in vafa obftructa impetu majori ruebant, & magis fæviebat morbus. Hæc etiam fententia ab evacuatione larga materiæ acris, acidæ, aut biliofæ vomitu vel fecelfu rejectæ, quæ multis horum contigit, non parum confirmatur. Sic etiam Mania, temperamenti melancholici proles frequens, iis accidit, quibus tenfa fibrarum compago, acris vel biliofa humorum dyfcrafia, & adauctus calor fomitem morbi in cerebri vafcula impigerunt. De his autem plus fatis; quippe non morborum caufas, fed fucceffiones trado; cujuscunque enim generis fuerunt caufæ, hos fuiffe eventus certum habeo.

Hac

Hac æstate apparebant iterum variolæ, quæ usque ad hyemem protractæ sunt; confluentes plerumque fuerunt, non tamen eo gradu ut in anno 1723. Hæ æque ac alii morbi febriles supra memorati, & eandem forsân ob causam, impetu magno in caput ruebant. Ad ferox hoc symptoma præcavendum, vel jam adventum leniendum, missio sanguinis ex venis inferioribus apprimè utilis fuit, eo quod inflammationem appropinquantem magis superabilem reddidit, & revulsione citata superioribus corporis partibus levamen attulit; non modo ob auctam vim circulatoriam per inferiora durante sanguinis effluxu, verum etiam ob aquæ tepidæ fotum cruribus & pedibus applicatum; cujus ope major fiebat in has partes humorum derivatio, & procul a capite liberior pustularum eruptio. Quamvis enim  
missio

missio e jugulari sanguine, præca-  
veri forsan potuit imminens malum,  
majori tamen ratione ad superiora,  
ad faciem scilicet & cervicem, de-  
rivatur sanguis, unde magis disten-  
dentur hæc vasa, & major erumpet  
pustularum numerus; ut ex fonticulis,  
ulceribus diuturnis, fotuum  
& cataplasmatum Chirurgicorum ef-  
fectibus, aliisque derivantibus vide-  
re est; has autem partes aliis ma-  
gis pustulis obsideri, periculosum  
esse cuivis notum est.

Mirum autem merito videatur,  
cur urgente febre inflammatione  
stipata, imo plethora, & ætate ju-  
venili, de sanguinis missione non  
pauci hæsitent medici; ne, vel  
non erumpat, vel retrocedat mate-  
ria morbifica; cum vigor febris, &  
vis ea notabilis, quâ plerumque e-  
rumpunt pustulæ confluentes, hanc  
rem extra dubium ponunt; & hoc  
non



non tantum in ipso morbi insultu, quin etiam facta pustularum eruptione, aliove quolibet morbi stadio, modo a pulmonis, cerebri, partive alicujus vitalis inflammatione, ægrotis immineat periculum; quamvis enim in ipso morbi initio optime instituitur hæc evacuatio, eruptis tamen pustulis si perstat vigor febris, & atrocia urgeant symptomata, pro re nata repeti nihil vetat. Quippe non tam morbi tempora, & inania malignitatis nomina, quam symptomata ægri vitam in discrimen inducentia respicere debet medicus. Et revera quamvis ex vigore febris in primis morbi diebus, de ejus genio multum patet, eruptis tamen pustulis, certius de symptomatibus brevi adventuris morbique eventu, quàm antea, dijudicare licet; & proinde hoc, præ cæteris, stadio, (priusquam scilicet facta est  
suppu-

suppuratio) summa arte tentandum ut ea evitentur symptomata, quæ ex morbi natura necessario novimus consecutura. Ad hoc autem maxime valet hæc evacuatio, quam non solum tuto fieri, aut si postulat morbi indoles, repeti, quin etiam aliis evacuationibus huc spectantibus coniungi, & posse & deberi, me olim multiplex docuit experientia. Præterea fœminis fere omnibus, hujus morbi decursu, menses profluere, easque exinde melius se habere quis non novit, etiam si periodo non assuetâ fiat hæc sanguinis evacuatio? Nec minus alios larga e naribus hæmorrhagia ab orci faucibus ereptos novimus; cur vero, natura non adjuvante, idem levamen non concedat ars, vix solvi posse videtur.

Suspicio quædam Sydenhami, quæ de hujus evacuationis utilitate dubitat clarissimus ille medicus, propter

ter

ter ægrotam quandam e Rheumatismo Phlebotomiæ ope convalescentem, in qua plurimum confluebant variolæ, multis dubitandi ansam præbuit, an revera ex usu sit: Si vero ad statum sanguinis rheumatismo familiarem attendemus, clarissimè patebit, variolarum appropinquantium confluxum, a missione sanguinis prægressa, in tali casu, nequaquam præcaveri potuisse, talemque effectum frustra inde expectari. Quippe ad vasorum tensionem laxandam, febris æstus moderandum, spatiumque diluentibus & attenuantibus concedendum, mittitur rheumaticis sanguis, ea ratione, qua postulat morbi indoles, desinentibus autem doloribus, diu statum hunc inflammatorium gradu aliquo retinet sanguis, non obstante prægressa venæsectione, ut tam accuratum sanguinis examen post toleratum

tum febris decursum, quàm frequens morbi ex levissimâ causâ recrudescencia docent, & hoc non tantum in iis corporis partibus, quæ olim affectæ fuissent, & quibus vascula gradu aliquo obstructa supponi possunt; quin etiam in iis, quæ antea doloribus nequaquam fuissent affuetæ. Talis itaque sanguis viscido & stimulo scatens inflammatorio, accedente materie variolosâ, duplicatis viribus ægrum invadet, & in ultimis membranarum vasculis detineri, ibique pustulas & inflammationes excitare, sanguine naturali, magis erit pronus, & necessario sæviores erunt variolæ. Quod ipsum etiam probat experientia; nullum quippe novi hâc sanguinis dyscrasiâ in morbi accessu affectum, a quâcunque causâ ortum traheret hic sanguinis status, quin confluerent variolæ.

Et

Et revera si casum dominæ cujusdam variolis nigris laborantis, a seipso memoratum, satis perpendisset autor clarissimus, cui tertio ab eruptione die, temporeque non assuetò largissimè profluebant, & per totum morbi decursum durabant Menses, eum, vix talem promulgâsse suspicionem, ex cæteris scriptis, credibile est.

Male itaque ex hoc casu contra Phlebotomiæ utilitatem in variolis concluditur.

Multo autem pejus ægrorum salutem consulunt, qui timiditate potius quàm ratione adducti, tutam hanc horrent evacuationem, & æstuante sanguine defectum ejus vesicatoriis, cardiacis, aliisque stimulantibus, summo certè cum ægrorum periculo, supplere conantur. Quantum autem vis Febris, tam in hoc, quam futuris morbi stadiis, a tali metho-



do intenditur; aut quàm longè, effectibus suis, distat evacuatio sine stimulo promota, ab ea, quæ tum fibras vellicat & lacerat, tum ipsis humoribus, jam nimis acribus, majorem inducit acrimoniam, non opus est ut argumentis illustrem.

Dantur quidè̃m ægroti, prioribus licèt rariores, quibus, partim a debilitate generis nervosi, partimque ab humorum inertia & visciditate, revera languent vires. His quidem, & his solis, in hoc morbi stadio profunt vesicatoria, cardiaca, aliaque similia, ut ad vires morbo pares excitetur natura; nequaquam tamen prioribus, nisi forte symptoma aliquod grave stimuli opem, pro tempore, necessariò postularet.

Cùm autem de epispasticis hic sermo accidit, non rei nostræ alienum sit annotare, felicissimum applicandi tempus illud esse, (dictante  
tum

tum ratione, tum experientia,) quo respectivè pedes vel manus tumescere debent, modò eo usque deferri finit morbi indoles; eoque præcipuè, si in stadio morbi a natura destinato, non apparent hujusmodi tumores. Hoc enim tempore plerumque diminuitur ptyalismus, & turgent admodum humores, quos ad extrema pellere, & horum tumore ægrum levare, tum molitur natura, atque ideo, ut vel ad has partes copia larga quantociùs deriventur, vel ut alvo soluta pars aliqua foras eliminetur, postulat hic morbi status; utrum autem horum tum maxime eligibile, ab ægri viribus & symptomatibus urgentibus, an nimis scilicet intenditur vel torpescit febris, non præceptis generalibus determinandum est. (38)

Duravit

QUÆST. 38. Annon itaque, pro vario gra-

Duravit hæc calida & sicca aeris temperies usque ad *Junium*, ei-que succedebat tempestas humida & aquosa, quæ per totum *Julium* & initium *Augusti* porrecta est, spirantibus ventis plerumque ex plagis septentrionalibus.

Manebant adhuc febres quædam remittentes & intermittentes, numero tamen pauciores.

Circa

du inflammationis, vario morbi tempore, ægrotantis temperie, aliisque similibus, missio sanguinis, alvi solutio, epispasticorum applicatio, aliaque ejusmodi vel damnosa sint, vel ægris utilia? Et annon indicationes certiores pro tempestivo horum omnium usu, tam in hoc, quàm aliis morbi stadiis, a vigore vel torpore febris, & humorum redundantium colluvie, ægros opprimente, quàm ab aliâ quâcunque regulâ depromi possunt; hoc semper notato, quod si multum viget febris, & valent vires, a stimulis & evacuantibus dolorificis abstinendum est; si vero urgent contraria, admovenda sunt vesicatoria, & levioribus evacuantibus tractandus est æger? vide QUÆST. 21, 22, & Annum 1723.

Circa initium *Julii* apparebant Diarrhœæ, dysenteria, morbus Cholera dictus, aliique ejusmodi morbi ventriculum & intestina graviter afficientes, qui usque ad medium *Augusti* durabant; in cujus mensis initio iterum placidum & calidum fuit cœlum, & eadem temperie ad initium *Septembris* manebat. (39)

Ex hoc tempore usque ad finem *Novembris* cœlum variabile fuit & inconstans, ad humidum autem & frigidum aliis propius accedens. Hac tempestate nulli præ cæteris se ostendebant morbi, paucis aliis apparentibus, nisi qui singulis annis, hanc anni tempestatem, comitantur; quales sunt tussis pituitosæ, asthmaticæ gravedines, & morbi quidam chronici.

QUÆST. 39. Annon morbi hic enumerati ex tempestate hâc humidâ & frigidâ, calidam prædictam sequente, orti sunt; & QUÆST. 5. 31. probant?

Accessit, *Decembris* initio, acre gelu nive comitatum, spirante vento ex plaga occidentali, quod usque ad Christi natalem permanfit. Hoc tempore multum sæviebat gelu, altum stetit in Barometro Hydrargyrum, & ad gradum 80 cecidit Thermometri spiritus.

Rigida hæc aeris temperies pleuritides produxit & peripneumonias, aliosque morbos inflammatorios sanguine pleuritico stipatos, quales in simili tempestate antea numerantur, & phthificis, hecticis & languidis, diarrhœas & laterum dolores inducendo exitialis fuit.

Reliqua hyemis pars admodum fuit frigida, quoad alias autem aeris qualitates inconstans; nive, gelu, & pluviis frigidis alternatim se excipientibus.

Hoc tempore grassari desinebant in hac urbe variolæ, non tamen in  
locis



locis vicinis ; acriora etiam, appropinquante hyeme, & sæviente gelu, quàm in æstate præcedente fuerunt symptomata.

Circa finem *Februarii* constanti fere modo spirabat Aquilo, fuitque hæc anni tempestas frigida & sicca, quæ cœli temperies per totum fere mensem sequentem porrecta est.

Hoc tempore plurimum grassabantur pleuritides, peripneumoniæ, anginæ, rheumatismi, dolores podagrici & arthritici, tussés convulsivæ ex fero acri laryngem vellicante, aliique consimiles morbi sanguine inflammato pulsuque duro conjuncti, qui omnes sanguinis missione, catharticis, diluentibus, aliisque pro re nata variatis profligati sunt, nec aliquid novi aut insueti producebant.

Circa finem hujus mensis, viz. Annus  
*Martii*, spirabant Australes, deci- 1727.

derunt pluviae multae, copiosae; calidior fuit aer, & morbi praedicti frequentiores fuere; forsan a rigiditate fibrarum, & diathesi sanguinis inflammatoria a sicca tempestate orientibus, & subitanea humorum rarefactione a caliditate producta, ut supra exposuimus. Hoc mense apparebant iterum in hac urbe variolae, & aucto calore symptomatibus acrioribus saeviebant. (40)

Duravit eadem caeli temperies ad medium *Aprilis*, nisi quod venti, qui antea ab Austro spirabant, jam admodum incerti fuerunt & variabiles, non raro ab australi plaga in occidentalem, & inde in septentrionalem, in horis 24 percurrentes; quo tempore paulo frigidior & hu-

QUAEST. 40. Annon subitanea frigidi & siccis aeris in calidum conversio, eundem effectum in variolarum, aequae ac morborum praedictorum inflammationem augendo, produceret?

midior

midior fuit aer, graffantibus adhuc morbis prædictis.

Circa medium hujus mensis placidum & calidum fuit cælum, imbribus aliquando comitatum, venti tamen omnino incerti fuerunt & variabiles; quæ cœli temperies in priorem mensis sequentis partem porrecta est.

Hac tempestate apparebant febres quædam remittentes & intermittentes; priorum autem paroxysmi more incerto & omnino irregulari recurrebant, urina turbida fuit & sedimenti expers, tam in remissionibus, quàm in ipsis paroxysmis; pulsus creber fuit & debilis, lingua alba & humida, & languore spirituum conqueſti sunt ægri. In iis etiam ægrotis quibus paroxysmi modo regulari recurrebant, & perfecta secuta est ἀπυρεξία, sedimentum rarò lateritium, sed plerumque subalbidum

dum, flavedine pauca tinctum deposuit urina.

Laterum etiam dolores ægros afficiebant, & irregulares hos paroxysmos frequenter comitati sunt, iisque vigentibus plurimum augebantur, declinante verò paroxysmo mitiores erant, sed raro cessabant.

Pleuritides etiam veræ & peripneumonix, æque ac prædictæ symptomatix, hoc tempore grassatæ sunt; inflammatione tamen iis dissimiles, quæ ægros in hyeme præcedente & initio veris afficiebant. His enim sanguis minori gradu fuit inflammatus, pellicula inflammatoria vel penitus abfuit, vel longè fuit tenuior, neque missione sanguinis æquè levati sunt ægroti. Pulsus etiam plerumque mollis fuit & creber, admodum tamen incertus & variabilis; manebant autem laterum dolores plerumque fixi & immobiles

les, languescebant spiritus, ægrique debiles & languidi fiebant.

Hi dolores musculos intercostales imprimis ferè aggressi sunt, frequenter verò, morbo ingravescente, pulmonem ipsum afficiebant, & peripneumoniæ lentæ, sæpiùs quàm inflammatoriæ, speciem præ se ferebat morbus; in quam transiere admodum pronus fuit. Missio sanguinis his quàm prioribus parciori manu institui potuit, minorem tamen hanc quantitatem gradu quodam supplevit catharsis, mollibus, blandis & diluentibus medicamentis excitata, respectu semper habito, tam ad copiam inertis pituitæ, ægroque obesitatem, quàm ad acriorem seu lentio rem febris comitantis decursum; pro quorum ratione, cathartica plus minusve attenuantia postulabat morbus. Hærente verò altis radicibus malo, languescentibus viribus



viribus, vel urgente magna pituitæ faburra, vesicatoria & medicamenta volatilia, leni stimulo ægrorum vires excitantia, largâque diluentium copiâ haustâ, magno fuerunt ægrotis præsidio.

Quamvis enim ad dolorem sedandum parum immediate contulerunt hæc remedia, sanguinem tamen solvendo, & torpidum fibrarum motum excitando, non tantum ad morbum debellandum, ægrumque sustinendum multum conducebant ; quinetiam pulsus vacillantem excitando, missionem sanguinis repetitam, multis omnino necessariam, tutiorem & utiliorem reddebant.

Nec minus in pleuritide vera prædicta, dum mobilis fuit materies, missio pro re nata sanguine, profuerunt cathartica sanguinem minime accendentia, quippe tam stimuli quàm

quam evacuationis ope, aliò derivatur sanguinis impetus, diminuitur dolor & resolvitur inflammatio ; in quibus veram poni hujus morbi curationem olim observavit Sydenhamus. Parum enim expectorationi fidendum esse docent, tum materiæ in morbi initio tenuitas, tum partium affectarum structura. Et revera nihil obstat, vel ex morbi natura, partisve fabrica, quo minus in hac, quàm aliis inflammationibus conveniat hoc remedium.

Ante *Maii* medium mutata est cœli facies, frigidior fuit aeris temperies, copia larga decidebant pluvix, fuitque hæc anni tempestas solito frigidior, spirantibus adhuc incerto modo ventis, frequentius autem e plagis borealibus ; quæ cœli facies, paucis exceptis diebus, per totum mensem sequentem extensa est.

Durabant

Durabant morbi supra memorati, hoc autem observare licebat, quòd ægri febribus intermittentibus vel remittentibus affecti frequentius in frigidâ quàm calidâ temperie de doloribus pleuriticis conquesti sunt. (41)

Temperamentum aeris per totum hoc ver initiumque æstatis usque ad *Julium*, prioribus omnibus magis fuit inconstans & variabile, tam calore & frigiditate, quàm perpétuis ventorum mutationibus; non tantum pro ratione plagarum a quibus spirare, quin etiam pro afflatuum frigore & fortitudine. Has variationes maxime notabiles supra enumeravi, singulas autem recitare non modò impossibile, quin etiam Lectori inutile

QUÆST. 41. Annon hic effectus, in his febribus a majori fibrarum constrictione, & densiori sanguinis crassi in tempestate frigida, æquè ac in veris inflammatoriis, penderet?

tile & fastidiosum fuisset; adeo enim incerta & variabilis fuit hæc tempestas, ut vix duo sibi invicem similes evaserint successivi dies. (42)

Circa initium *Julii* multo calidior fuit aeris temperies, ascendebat enim Thermometri spiritus usque ad gradum 25, qui mense priore vix ultra 45 assurrexisset.

Hoc mense nonnullos invasit febris putrida, at plurimùm grassatæ sunt remittentes & intermittentes. Eruptiones etiam cutaneæ hos morbos sæpe comitatæ sunt, aliquando fusci coloris, quæ semper siccæ, alia autem sero pellucido plenæ, quæ  
ex

QUÆST. 42. Annon incertum hoc cœli temperamentum fibrarum tonum perpetuò variando, & fluidorum motum & texturam, propter rarefactionem vel condensationem adeo mutatam, afficiendo, morbos incertos & mali judicii produceret? Et annon hoc cum quibusdam Hippocratis observationibus perfectè congruit?

ex labe scorbutica pendentes, pruritu molesto ægros torquebant. Hæ exanthematum species a varia materiæ perspirabilis tenacitate & volatilitate, vel variis vasorum orificiis, & densitate cuticulæ, oriri videbantur ; neque aliam medelam postulabant, quàm ut levium diluentium ope, perspiratio paulo liberior evaderet. (43)

Hoc tempore remittentes prædictæ non tantum frequentiores fuere, sed symptomatibus gravioribus comitatæ sunt, quàm in vere præcedenti. Per dies enim aliquos febris putridæ speciem æmulatæ sunt, postea verò remittebant, & in tertianas seu

QUÆST. 43. Annon frigidior & humidior aeris temperatura, perspirabile retinendo, in causa sit, quod restitutâ calidâ temperiè erumperent hæ petechiæ ; eoque præcipuè quod in morbi declinatione apparebant, adaectâ tum majori copiâ ad cutis emunctoria febrili materie?



feu potiùs *ἡμιτεταναίως* convertebantur. Ægroti hoc tempore affecti plerumque somnolenti & stupidi, præsertim in paroxysmis, apparebant, & lassitudine, debilitate, & spirituum languore conquesti sunt; quæ etiam symptomata febris putridæ accessum, majori tamen gradu, comitata sunt.

Fuit enim in hac pulsus plerumque creber & debilis, lingua arida & fusca; urina rubra & sedimenti expers, in remittentem autem post sudores sponte ortos, aut solâ diluentium copiâ productos, lenemve alvi solutionem non raro transivit; & sedimentum rubro-flavum deposuit urina.

Languidis & hystericeis hoc morbo affectis multum laborabat nervosum genus, majori ratione vacillabant spiritus, diutius protracta fuit febris, & sine crisi sensibili sensim

H

vires

vires recuperabant ægroti, ut in febribus quibusdam languidis & nervosis supra memoravimus.

Duravit hæc cœli & morborum constitutio usque ad *Septembrem*, nisi quod circa medium *Julii* spirabant venti boreales, decidebant pluvix, & per dies aliquos frigidior fuit aer; in priorem tamen statum ante hujus mensis finem redivit.

Hoc tempore accidebant alvi profluvia, tormina, & morbus Cholera dictus, quæ ægros nonnullos ex improvviso occiderunt; duabus autem vel tribus septimanis penitus evanuerunt.

Tempestas autumnalis in *Septembre* & *Octobre* frigida fuit & humida, & multum grassatæ sunt intermittentes, præcipuè verò quartanæ.

Circa finem *Octobris* spirabat Aquilo, frigidum & gelosum fuit cœlum

lum, & Thermometri spiritus ad 75 descendit.

Hæc aeris constitutio etiamfi ultra 14 dies vix porrecta est, mala non levia multis attulit, iis autem præ cæteris, quibus vires a repetitis intermittentium reditibus collapsæ sunt. Acciderunt enim non paucis sævæ pleuritides, peripneumoniæ, & anginæ; præcipuè verò priores.

Febres remittentes paulo post gelidæ tempestatis accessum grassari desinebant, non autem intermittentes; admodum enim frequentes fuerunt quartanæ, & totam fere plebem occupabant; desinente autem gelida temperie, humidum & frigidum iterum fuit cælum, & cujuscunque generis grassabantur intermittentes, adeo ut aliquam harum speciem præ cæteris dominari vix deprehendere potui.

Circa medium *Decembris* acre gelu cœlum per tres septimanas occupavit, fuitque reliquum *Januarii* admodum frigidum, nive, & ventis aquilonaribus fociatum.

Frigida hæc anni tempestas, ut prior, tertianas non paucas in quartanas commutavit. Peripneumonias etiam quasdam veras, maximè verò lentas, & spirandi difficultates, pituitosis & ætate provectis attulit; *Junioribus* autem maximè pleuritides, tam veras quàm symptomáticas; iisque horum præ cæteris, qui febribus intermittentibus antea affecti fuissent. In horum plurimis laterum dolores a febre intermittente omnino pendebant, & intermittentium more cum paroxysmis recurrebant & desinebant; & hoc more magis regulari, quàm in vere prægresso.

Ex

Ex his multi perierunt, quibus vel defuit cura morbi, vel medelæ opportunitas. Pœnas etiam graves non raro luebant ægroti, dum vel respectu tantum habito ad intermittentes, prorsus neglecta est missio sanguinis; vel e contra, dolorum lateralium causâ, nimiam sanguinis jacturam sustinebant.

Quamvis enim sine sanguinis missione, qui plerumque inflammatus fuit, raro sanati sunt ægri, adeo tamen languescebant vires & diminuta erat fibrarum tensio, ut largas evacuationes sine insigni virium lapsu non sustinebant; forsan ob viscidum & vapidum humorum sta-

H 3                      tum

QUÆST. 44. Annon ex hoc statu corporis, & gelida hac aeris temperie patet horum effectuum ratio? Et annon ex iisdem patet, cur intermittentes hæ prioribus sint perfectiores; late- rumque dolores paroxysmis certius responde- rent?



tum ab intermittentibus productum. (44)

Maxima *Februarii* pars, ratione habitâ ad anni tempestatem tepida fuit, quo tempore, dolores pleuritici & cephalalgia in paroxysmis intermittentium, magis quàm antea, urgebant; & ad delirium excitandum prona erat febris. Hoc autem symptomata missione sanguinis, & regimine debito, facile præcaveri potuit. (45)

Circa hoc tempus angina multæ, summa cum suffocatione sociatæ, grassatæ sunt; quæ, nisi brevi solutæ, exitiales fuerunt. (46)

Annus  
1728. Idem morbi *Martium* comitati sunt, quo tempore admodum inconstans

QUÆST. 45. An quæstionem 36 non probant hic aeris status, & horum morborum symptomata?

QUÆST. 46. Annon a prædicto statu corporis, & rarefacto, ab aucto calore, sanguine, patet etiam hujus morbi causa?

stans fuit cœlum; æque tamen ac in aliis annis tepidum. Circa finem hujus mensis intermittentes quartanæ, quæ per totam hyemem mansissent, in tertianas & quotidianas converti incipiebant, inter quas etiam remittentes quædam caput ostendebant; præcipuè tamen in mense subsequente, cujus initium solito calidius fuit. Brevi autem succedebant pluvix ferè continuæ, tepidæ, quæ in mensem *Maium* porrectæ sunt; quas sequebatur aeris temperies valdè calida.

Paulo post hoc tempus iterum caput attollit febris putrida. (47) (48) (49).

Symp-

QUÆST. 47. Annon successio harum febrium sibi invicem, pro ratione aucti vel diminuti caloris, tam in variis annis, quàm variis ejusdem anni tempestatibus, naturam & indolem earum eandem fere esse demonstrat; differentias autem a minori fluore lentoris febrilis, & torpidiore

Symptomata in accessu morbi  
plerumque mitia, benigna, & ne-  
quaquam periculosa videbantur,  
neque

sanguinis motu, in tempestate frigida; & a fluxiliori statu, agiliori motu, & majori forsan copia, acrimonia, & putredine in calidiore, plurimum pendere? durante enim calore regnavit febris putrida, hoc autem declinante, in intermittentem, & deinde hyemis frigore in quartanam, convertebatur. Pari etiam ratione accedente vere, iterum surrexerunt intermittentes, quæ pro ratione caloris adaucti, febribus continuis similiores evaserunt, quousque tandem auctis ulterius volatilitate, acredine, & putredine materie, febrem putridam producebant. Et annon hoc sic se habere, exinde etiam patet, quod quo magis ad intermittentes perfectas vergunt febres, & longiori intervallo sibi mutuo succedunt Paroxyfmi, eo cæteris paribus, dissolventia fortiora postulant, & vice versa; ut tam in remittentibus quàm intermittentibus quotidianis, tertianis, & quartanis videre est. Vide quæst. 6. 10. 11. 15. 17. 19.

QUÆST. 48. Annon itaque hinc patet, cur febres putridæ, ardentes & continuæ remittentes, in intermittentes sæpe sponte desinant? Et cur exacerbatio symptomatum die pari, inter signa mala ab Hippocrate numeratur? Quippe hæc febres, cum bonæ sunt indolis, tertianarum legitimarum more, a primo fere insultu exacerbantur

neque multum a statu naturali deflectebat pulsus, infausto tamen non raro eventu.

Urina rubedine minori quàm anno priore tincta fuit; in quibusdam turbida mansit, in aliis autem ægris sedimentum subalbidum & flavescens parcâ tamen copiâ deposuit, sensim autem morbo ingravescente pallescebat. Circa faciem & pectoris regionem ægri plerumque sudabant, dum calor & siccitas reliquum corpus occupabant, & in fine morbi

cerbantur & remittunt; Anomalæ verò non ante diem sextum, octavum vel decimum, remissiones & exacerbationes regulares ostendere incipiunt, & ideo harum mitissimæ vix ante quintum remissionem pati possunt; quod tam materiæ febrilis copiam majorem, quàm auctam putredinem denunciat.

QUÆST. 49. Annon hinc patet, cur intermittentes vernaes sæpe accedente calore sponte solverentur; Autumnales verò, hyemis frigore pejores & diuturniores fierent; dissoluto scilicet a calore lentore, vel auctâ ejus visciditate in tempestate frigidiorè; ut &, cur una alteram sæpe profligaret?

morbi Aphthæ palatum & oris velamenta obfidebant.

Hæc symptomata in dies augebantur, accedente circa diem duodecimum, nonnunquam citiùs, delirio; cum urina tenui, pulsu debili, frequenti, inæquali, cui motus tremuli, collectio floccorum, aliaque mortis prænuncia succedebant. Hoc autem observatu non fit indignum, quod ægrorum nonnulli vomitu & copioso alvi fluore primis hujus febris diebus correpti sunt, qui omnes brevi sanitati restituti sunt; profligatâ scilicet, vel horum ope, omnino febre, vel diminutis ejus viribus in intermittentem conversâ.

Pari quidem successu dato vomitorio, & postero die institutâ Catharsi, leviora fiebant symptomata, & sæpe in intermittentem vel remittentem convertebatur hæc febris, quæ aliter incerti & admodum fallacis



lâcis fuit judicii, illâque anni prioris longè periculofior.

Hic autem effectus alvi folutioni maximè tribuendus effe videtur, eo quod vomitorium omiffa catharfi, non æque feliciter ægris fufficit, ac omiffio vomitorio Catharfi; forfan quia tam hæc febris, quàm illæ initio veris apparentes, caput & fuperiores corporis partes præ cæteris afficiebant, & ad delirium excitandum pronæ fuerunt. Hunc autem falubrem lenium Cathartorum, præ vomitoriis, effectum, in aliis etiam febribus sæpe notavi, maximè verò quibus furfum tendebant humores. Et revera meritò quæri poteft, an confans Emeticorum in accelfu febris exhibitio, ut vu't Sydenhamus, & ponit hodierna praxis, nifi a materie prava in ventriculo hofpitante indicatur, mala non levia poft fe frequenter trahat; cum

ex

ex quàm plurimis causis, ab hac longe diversis, derivari posse hunc vomendi conatum, docent partium consensus & nervorum propagines. Certè, ni me multum fallit observatio, Emetica in febribus caput petentibus non tantum inutilia, quinetiam perniciofa symptomata in morbi decursu producentia, a Cerebri vasis nimis inde repletis & concussis, non rarò notavi. (50) (51)

Hic

QUÆST. 50. Annon urina in morbi initio turbida, sensim verò morbo ingravescente pallescens, remissio symptomatum accedente diarrhœa, cæteraque morbi phænomena materiam febrilem largâ copiâ ingestam, vasculis extremis validè impactam, coctu difficillimam, naturæ vires morbo impares, & ad crisin regularem producendam nimis imbecilles esse demonstrant?

QUÆST. 51. Annon morbi hyeme & veris initio apparentes, sanguinem acrimoniâ & lentore, liquidum autem nerveum auctâ acrimoniâ & diminutâ copiâ peccare denunciant? Et annon talis liquidorum status, superveniente tempestate

Hic autem obitèr adnotare conveniat, scilicet, quod, ineunte febre quâlibet epidemicâ, frequentissimè accidit, sanos & ad negotia valentes, levi aliqua de causâ per dies quosdam ægrè se habere, quos vel spontaneum alvi profluvium, vomitus, sudoresve a natura excitati sanitati restituunt ; quæ excretiones criticæ, licèt in variis hominibus diversæ sint, singulæ tamen alicujus præ cæteris frequentia indolem ineuntis epidemici haud raro denunciat, viamque monstrat, quâ præ cæteris, in morbo accedente materiem febrilem extrudere, ægrosque levare molitur natura. Adeoque certa & constans est hæc naturæ methodus, ut

pestate calidâ & humidâ, corpus ad febrem mali moris suscipiendum necessariò inclinât ? Annon hæc olim observarunt Medici ? Et an hoc non docent Aphæ ?

ut vix quemquam synochum epidemicè grassantem recordari possum, in quo, etiamsi de hac re ne minimum tunc temporis suspicarer, hujus generis indicium non prodidit natura.

Eodem tempore apparuit febris huic similis, nisi quod maculæ rubræ pulicum morfibus non abfimiles, & nonnunquam interspersus rubor, more marmoreo variegatus, circa pectus apparuere. Respiratio ante exanthematum eruptionem difficilis, anhelosa, & suspiriosa, iis autem apparentibus, levior fuit & pacatior. Multis horum caput dolebat, in quibus sæpe sequebatur enaribus sanguinis eruptio, qui per secessum nonnunquam, sed rariùs, ejectus est. His missio sanguinis ex usu fuit, (de salubri cujus eventu, capitis dolor, in his quàm aliis, major, satis certum exhibuit præsagium)

um) neque exanthematum eruptioni obstabat, ut ut de materiæ brevi ex pulsura cunctatione delirent timidi; rariùs autem prioribus necessaria fuit talis evacuatio. A regimine calido & cardiacis fortioribus advenit utrisque delirium, & mors præ foribus adfuit, sive fallaci materiæ expellendæ nomine, aliòve quolibet titulo specioso exhibita fuere. Quoad reliqua symptomata cum febre supra descripta congruebat. An verò hæc & illa planè ejusdem sint speciei, & a particulari quadam ægrotorum idiosyncrasiâ, phænomenis quibusdam diversæ fierent, asserere nolo. Hoc tamen a complurium symptomatum similitudine, & ab evacuationibus, licèt diversis, in morbi accessu utrisque necessariis, veritati non absimile videtur.

*Junii* temperies calida fuit & sicca, vento paucò, eoque plerumque

ex



ex plagis australibus & occidentalibus conjuncta.

Duravit more prædicto febris putrida, & multum grassatæ sunt remittentes; multique ex iis qui hyeme aut vere præcedenti febribus intermittentibus affecti fuissent, febre hecticâ, sudoribus nocturnis, vigiliis, doloribus vagis, & totius corporis languore laborabant.

Circa medium *Julii* frigidius fuit cælum, descendebat Thermometri spiritus ad 45, ventus, austrum relinquens, ex septentrione spirabat, & descendebant pluvix.

Hoc tempore pleuritides & anginæ supra descriptæ iterum recurrebant, & intermittentes frequentius redierunt, eos præ cæteris afficientes, quos autumno vel vere præcedente corripuissent.

Redivit tempestas sicca circa finem hujus mensis, & per totum fere

re

re *Augustum* porrecta est, frigore tamen majori conjuncta quàm huic anni tempestatì familiare est.

Duravit adhuc febris putrida, symptomatibus tamen hoc tempore gradu aliquo diversis, tam ab iis quæ æstatis initio hanc febrem comitata sunt, quàm iis quæ eamanni præcedentis obsidebant. Quippe rarò stupidi & somnolenti fuerunt ægri, ut in anno priore; urina etiam non æquè turbida fuit ut posteriore febre, pulsus verò plerumque fortior erat, magis delirabant, & atrociores fuerunt ægroti: Missionem etiam sanguinis ad remissionem symptomatum procurandam sæpiùs postulabat febris. Quæ omnes symptomatum variationes, à variatâ fibrarum stricturâ, densiori sanguinis compage, motuque ejus validiore & magis inflammatorio, huic quàm præcedenti aeris consti-

tutioni magis familiaria, pendere videntur.

Eodem tempore plurimum grassatæ sunt remittentes, & easdem in symptomatibus variationes passæ sunt quas in febre putrida numeravimus; tandem verò in intermittentes convertebantur, & pro variis ægrorum viribus, variisque inflammationis gradibus, quotidianas, tertianas, vel quartanas producebant.

Aucta in *Septembre* frigiditate, & spirantibus ventis aquilonaribus, salubrior aliquo gradu evasit tempestas. Evanuit enim febris putrida, & minùs grassabantur remittentes; manebant tamen æquè frequentes intermittentes, frigore majori, doloribus pleuriticis & rheumaticis in paroxysmis comitatæ. Hæc autem symptomata, profligatâ febre, sponte cessabant; Evacuationes tamen paulo majores, & pro morbi  
genio

genio variatas, quàm intermittentes simplices postulabant.

Duravit hæc aeris & morborum constitutio per totum ferè *Octobrem*, eique succedebant pluvix copiosæ, & tepidus spirabat auster, quæ cœli temperies ad finem ferè *Novembris* extensa est. Hæc anni tempestas admodum fuit salubris, morbi enim vix ulli, paucis exceptis intermittibus, apparuerunt. Circa autem hujus finem ab australi in borealem plagam transivit ventus, & aere gelu cœlum, per duas hebdomadas occupavit, quo tempore quantitate non exiguâ descendebant nives.

Subitanea gelidæ tempestatis accessio, quâ Thermometri spiritus primò a 56 ad 76, & paulo post ad 80 descendebat, & quæ solito citiùs advenit, alvi profluvia, tormina, & dolores pleuriticos in par-

oxyfmis intermittentium (quæ sparsim tantùm apparebant,) & apoplexias quasdam, & nervorum resolutiones, præcipuè circa gelu solutionem adduxit.

Paulo ante Christi natalem iterum rediit gelu multa nive comitatum, & rigiditate summâ circa mensem duravit, eosdem morbos producens, quos hyeme gelosâ anni 1715 supra descripsimus. Remittentes autem nullæ & intermittentes paucæ tantùm apparebant. Soluta autem gelu iterum caput attollit febris intermittens, doloribus pleuriticis in paroxysmis frequenter sociata. Grassabantur etiam multæ pleuritides, anginæ, & peripneumonix veræ & nothæ, tam sanos quàm eos occupantes, qui febribus intermittentibus æstate vel autumno laborassent, multumque plebis è vivis sustulerunt. Hi ægri diuturnis febris



febris intermittens ictibus debilitati, missionem sanguinis largam, non minus quàm Anno præcedente, malè ferebant, & eandem medelam quam ibi descripsimus postulabant.

Longè autem secus iis sanis & robustis evenit; qui tempestate gelosâ morbis verè inflammatoriis correpti sunt, qui non obstante cœli rigiditate missionem sanguinis largam, eamque pro gradu symptomatum repetendam postulabant. Calor tamen externus solito major, & medicamenta paulo subtiliora, in his, quàm contrariis aeris temperamenti ægrotis fuerunt necessaria; quorum ope laxatæ sunt fibræ, & major sanguini conciliatus est fluor.

Ipsæ etiam intermittentes hos morbos æmulantes, quæ hoc tempore sanos & robustos obsidebant, sine repetitâ sanguinis missione vix

feliciter curari potuerunt. Hac enim omiffâ, vel parcâ nimis manu institutâ, in pleuritides aut peripneumonias veras & brevi lethales transiverunt; eoque præcipuè, si Corticem Peruvianum, ad intermittentem profligandam, præproperè sumpsissent ægroti.

Durante *Februario* admodum frigida fuit cœli temperies, multa nive, fortique gelu comitata, non tamen ea ratione, ut in mense præcedente, frigida.

Iidem morbi grassabantur, hoc autem per totam hyemem observare licebat, quod quò magis tepidus & placidus fuit aer, eò frequentiores fuerunt intermittentes, eoque magis ad speciem remittentium continuarum approximabant, & vice versa. (52) (53)

Et

QUÆST. 52. Annon hic morborum in se mutuo transitus, variis caloris & frigiditatis gradibus,

Et etiam, quod quò magis acris, rigida, & gelida fuit tempeftas, eò plus graffabantur morbi inflammatorii, & intermittentes horum speciem in paroxyfmis induebant.

*Martii* temperies frigida fuit & Annus  
1729.  
ficca, fpirante acri vento aquilona-

dibus, in hac tempeftate, æquè ac autumnò vel æftate præcedente eft tribuendus ; præcipuè cùm tam solidæ, quàm fluidæ corporis partes, eafdem mutationes ab his caufis fubeunt ? Hoc autem fieri, *viz.* unum aeris ftatum ab altero, in hac tempeftate æquè ac æftate, eadem ratione diftare docet Thermometrum.

QUÆST. 53. Annon itaque hinc folvitur problema illud difficile, cur morbi epidemici naturâ fuâ fimiles, in aeris temperamentis fibi invicem longè diffimilibus frequenter inveniantur ? Quippe eadem aeris temperies quæ in æftate frigida apparet, & humores denfiores fibrasque ftrictiores reddit, hyeme tepida videtur, fibrarum tonum relaxat, & fluida rarefcere cogit. Hoc autem Phænomenon occultam aliquam aeris facultatem epidemicis folùm originem præbere, medicos omnes fufpicari, imo & concludere induxit. Hic autem morbos nostros vulgares, non peftilenciales aut contagiofos intelligo.

ri, quæ cœli facies usque ad finem *Aprilis* porrecta est; adeo ut ipsum ver, ratione frigiditatis, tempestatî hyemali, potiùs quàm vernali simile fuit. Hac tempestate tussès puerulorum convulsivæ fere innumeræ, anginæ, peripneumonix, pleuritides, rheumatismi, cephalalgix, ophthalmix, erisypelatodes, pruritus, & eruptiones cutaneæ plurimùm grassabantur, quæ omnia à frigiditate hyemis prægressæ, & acri hac tempestate vernali oriri videbantur. Apparebant etiam intermittentes quædam paucæ tam regulares quàm anomalæ, hæ tamen plerumque quartanæ; quousque adaucto in vere calore, tertianæ & quotidianæ iis frequentiores fiebant; prædictorum tamen morborum numero nequaquam æquales.

Initio *Maii* pluvias frigidas largâ copiâ adduxit ventus borealis, quæ  
cœli

cœli facies ad medium fere mensis extensa est. Ab hoc tempore calidior fuit aer, gradu tamen solito minori, spirantibus ventis plerumque ex plagis orientalibus.

Duraverunt morbi inflammatorii per totum fere *Maium*, licèt minùs frequentes, largasque evacuationes, tam sanguinis missione quàm catharticis, pro morborum natura plerumque poscebant; sensim tamen adveniente calore decrescebant, quousque tandem *Junii* initio penitus evanuerunt.

Hujus mensis temperies calida fuit & sicca, paucis exceptis circa medium diebus, quibus descendebant pluvix largæ subfrigidæ.

Duravit hæc calida temperies per *Julium* & *Augustum*, & usque ad medium *Septembris*, nisi quod circa finem *Julii*, per dies aliquos, multum pluebat.

Hæc



Hæc tempeſtas ad finem fere *Auguſti* ſalubris fuit ; circa hoc autem tempus graſſari iterum incipiebant remittentes & intermittentes, & plurimos occupabant ; quæ poſteriores, ob paroxyſmos longos & duplicatos, ſpeciem continuarum præ ſe ferebant, ſenſim tamen vel parte aliquâ materiæ febrilis à vi febris ſubactâ & expulſâ, vel evacuationum generalium ope mitigatâ, in intermittentes regulares converſæ ſunt, & Corticis Peruviani viribus ſe ſubjecerunt. (54) (55)

Hic

QUÆST. 54. Annon hinc patet cur vigente febre continuâ vel paroxyſmo intermittens, infelici eventu exhibetur Cortex ; quippe auctâ hujus ope fibrarum ſtriſturâ, & diſſolutis majori ratione humoribus, augentur materiæ morbiſicæ vires & acrimonia, magis cum humoribus commiſcetur fomes morbi, & plus dominatur febris ; proſtigatâ autem hujus parte magis acri & mobili, vel vi febris continuæ, paroxyſmi particularis, aut regimine debito, non tantum

Hic autem obiter notare liceat, quod quamvis hæ febres plurimùm grassatæ sunt, tardiùs tamen hoc anno, quàm vulgò solent, se ostenderunt ; forsan ob tardio rem tempestatis calidæ adventum ; manebat enim aer solito frigidior usque ad *Junium*. Ex qua etiam causa fiat, quod etiam si multi his morbis affecti sunt, & admodum infalubris fuit tempestas, per totam hanc æstatem vix apparuit febris putrida. Circa idem tempus iterùm inter in-

tum diminuitur copia, sed blandioris naturæ fit lentor febrilis, & eventu felicissimo exhibetur Pharmacum ?

QUÆST. 55. Annon etiam hinc patet, cur errore medelæ intermittentes simplices in continuas, continuæ in febrem putridam, ardentem, vel malignam converti possint, & quinam hi errores ? Et annon etiam patet, quibus modis, & quo regimine, febres naturâ suâ periculosæ, in benigniores minusque lethales sæpe converti possint, & quo morbi tempore hoc præcipuè tentandum ?

fantes

fantes caput attollit tussis convulsiva suffocatione magnâ & ingenti materiæ pituitosæ copiâ, præcipuè circa adventum tempestatis humidæ succedentis fociata. Approximatio hyemis eundem in remittentes effectum quem supra ostendimus produxit, manebant tamen intermittentes, numero licet pauciores. (56) (57) (58) Humida

QUÆST 56. Annon in regionibus calidis, præcipuè ardente Syrio, torrida aeris temperies, præ cæteris, in causâ sit, cur febres putridæ ardentes, & malignæ his regionibus quàm frigidioribus magis sunt familiares; exusto scilicet magis sanguine, & vi caloris parte ejus blandâ spoliato, unde acrior, subtilior, & majori putredine donata est materies febrilis, & indolis pejoris necessariò fiat febris?

QUÆST. 57. Annon ipsa febrium malignarum natura, imo & pestilentiarum origo hinc intelligi possunt; exaltatâ scilicet ad tantam acrimoniam & volatilitatem vi febris & caloris putredine febrili, ut liquidi nervosi sanguinisque texturam subito prosterneret? Annon hæc stabiliunt pestilentiarum historiæ & phænomena; effluviis quorundam venenatorum natura

Humida tempestas circa medium *Septembris* incepit, quo tempore ventus orientem relinquens ab austro spirabat, & paucis exceptis diebus, ad medium fere *Decembris*, ingenti pluviarum descensu porrecta est, cæterisque omnibus prioribus magis humida fuit & nebulosa, ut tam Barometro quàm HygroscoPIO apparuit.

Hac

tura ; & putrefactiones quædam animales, tam morborum actione, quàm arte chymica, ad summam acredinem & volatilitatem perductæ & ingentes in humoribus mutationes, descriptis non absimiles, producentes ?

QUÆST. 58. Annon hinc etiam patet, cur febres remittentes & intermittentes huic insulæ, in aere frigido & humido positæ, adeo sunt familiares? Et cur priores tempestates siccæ & calidæ, posteriores autem eas paulo frigidiores infestarent ; & diminuto calore prioribus succederent? Et annon ab eadem ad intermittentes propensione, acribusque brumis quibusdam prægressis patet, cur hæ febres cum Laterum doloribus aliisque morbis inflammatoriis, in annis prædictis, adeo fuerint complicatæ?

Hac tempestate erupit febricula quæ omnes fere aggressa est, horrore levi, lassitudine, tussi ferè perpetuâ, raucedine, capitis dolore, & spirandi difficultate comitata; quæ symptomata sanis & robustis non multum damni attulerunt, & brevi evanuerunt. Mala autem non levia morbidis omnibus, præcipuè tabidis, cachecticis, senibus pituitosis, crassis, plenis, & iis qui febribus intermittentibus affecti fuissent, afferebant. His enim pleuritides & peripneumonias brevi suffocantes aliosque consimiles morbos adducebant, qui horum non paucos è vivis sustulerunt.

Hi omnes effectus, licèt tunc temporis, ob frequentiam & insultum subitaneum adeo admiratione habiti ut ad nescio quam aeris malignitatem a multis ascripti sint, a debiliore Pulmonis expansione, & perspirabilitate



rabilitate corporis, præcipuè partium maximè aeri expofitarum subito fuppreffâ, ex ipfa lege circulati-  
onis neceffariò produci videntur. Quippe obftipatis ab humidi frigidique aeris applicatione his partibus non tantum induci febriculam, quin etiam fortiùs in loca interna vicina impelli humores; & inde defluxiones, tuffes, raucedines, obftructions, & inflammationes ibi neceffariò fieri, docet ipfa vaforum ftrutura.

An autem his aeris qualitatibus quæ in hac urbe locisque vicinis hos morbos comitatae funt, tribuendi funt hi morbi, qui totum ferè regnum obfidebant, affirmare nolo, hac tamen tempeftate, quæ à ficcâ orientali in humidam australem subito converfa eft, hunc morbum hîc caput primùm oftendiffe, & per  
maximam

maximam ejus partem duravisse satis novi.

Qui labe hyſtericâ & hypochondriacâ antea affecti fuiſſent, hoc tempore male ſe habebant, & multi vomitu, dolore ventriculi & inteſtinorum flatulento & diſtendente laborabant. Doloribus etiam rheumaticis & arthriticis correpti ſunt languidi & ætate provecti, potiùs a colluvie ſeroſa quàm ab acrimoniâ materiæ inflammatoriæ obortis, ut ex partium affectarum tumore œdematoſo & lento dolore ſatis patebat.

Quidam etiam hoc tempore febre lentâ decubuerunt, pulſu molli, dolore vel gravedine capitis, ſudoribus vagis, ſpirituum languore & urinâ turbidâ comitatâ, quæ nunc ſudoribus, nunc diarrhœâ judicata eſt, frequentiffime tamen in intermittentem convertebatur.

Hic

Hic morbus ad remittentium prædictarum classẽ pertinere videbatur, licet variationem quandam ab anni tempestate cœlique differentiâ subiret, a quorum effectibus pulsum debiliorem, caputque majori gravedine affectum fuisse admodum verisimile est; tam ob hujus tempestatis effectus in sanos, quàm ob eadem phænomena, in simili aeris temperie, has febres comitantia. Ægris enim omnibus, ex quocunque ferè morbo laborantibus, accidebant tussis ferè perpetua, dolor aut gravedo capitis, stupor, & somnolentia.

Hac tempestate sparsim apparebant variolæ, moris autem magis benigni & discreti, quàm in alia qualibet unquam vidi; quod forsan ab humida & molli aeris temperie, ob rationes supra allatas, accideret.

K

Tempeſtas

Tempeſtas humidiffima a me obſervata, hâc ſolâ exceptâ, anno 1725 accidit; illa autem poſterioris veris, æſtatiſque maximam partem occupavit; ſpirabant etiam venti ſeptentrionales, ſolito frigidior fuit aer, & vernali quoad frigiditatem non abſimilis; non tamen fuit inſalubris, paucis tum apparentibus morbis; forſan quia minus a præcedente decederet aeris ſtatus, & etiam, quod effectum nimiae humiditatis, gradu aliquo, diminueret ſeptentrionalis venti vis contractilis. Hæc autem conſtitutio autumnum & initium hyemis, prægreſſâ tempeſtate calidâ & ficcâ, poſſidebat, & humidi ſpirabant Auſtri, quæ ambo vires ejus augerent, majorem humorum colluviam producerent, in deſcriptas corporis partes dirigerent, morbiſque prædictis, præcæteris, ortum præberent.

In

In utrisque autem effectum diurnæ humiditatis observare licet; diverso quamvis gradu, pro ratione tempestatis præteritæ, & frigoris ad-aucti. Erupit enim in ambobus lenta febricula, tussi, capitis gravedine, stupore, somnolentiâ, & aurium hebetudine comitata; pituitâ gravabatur pulmo; sæviebant passionēs hystericæ & hypochondriacæ, iique qui apparebant morbi inflammatorii, mitiores erant & benigniores.

Circa medium *Decembris* sensim decrescere incipiebant pluvix usque ad Christi natalem, quo tempore placidum & serenum fuit cœlum, austris adhuc leviter spirantibus, adeo ut veri potius quam hyemi similis fuit aeris temperies; parum enim adhuc apparuisset gelu, nullæ descendissent nives. Paulo ante medium *Januarii* spirabant borea-



les, frigidior fuit aer, & descendit pauxillum nivis ; redivit autem brevi ad priorem temperiem cœlum, eâque ut plurimum ad finem *Februarii* permanfit. Circa hoc tempus redibant boreales, & descendebant majori copiâ nives, quibus ingenti copiâ succedebant pluvix frigidx, quæ ad *Martii* medium porrectæ sunt.

Posterior hyemis pars non admodum fuit insalubris, tabidos autem quosdam & asthmaticos quasi ex improvifo enecavit ; auctis subito tum spirandi difficultate, tum crurum tumoribus. Tempestate etiam frigidâ apparuerunt quædam pleuritides, alii que morbi inflammatione stipati ; grassabantur variolæ, moris autem benigni ; & apparebant febres quædam miliares, petechiales, & intermittentes, nequaquam

quam tamen confortim grassantes.

Irregulares plerumque fuerunt hæ intermittentes, maximè tamen vel caput dolore insigni periodico, vel thoracem pleuritidis specie occupabant. Missò autem sanguine, vel institutis pro re nata aliis evacuationibus, corticis Peruviani viribus se subjecerunt, aliamque medelam vix postulabant. In his autem morbis tractandis, præpropæra hujus pharmaci exhibitio, ut sæpe notavi, sic hoc etiam tempore, gravia non rarò induxit symptomata: Quippe in his, ut in pleuritide vera, sanguis plerumque inflammatus fuit, atque ideo dato nimis citò pharmaco, in vasa obstructa & contracta impetu nimio ruebat sanguis, & pejora fiebant symptomata.

Nec minus in simplicibus etiam intermittentibus feliciter curandis,

& penitus profligandis frustra sæpe operam impendunt, qui solâ corticis ope curationem moliuntur, nisi regimine debito in statum, ad effectus medicamenti recipiendos idoneum, reducantur aegri. Imò & profligatâ febre, non leves sæpe superandæ sunt difficultates, priusquam ex toto convalescunt ægroti; qui pro diversis temperamentis, variis vivendi modis, febrisque effectibus, morbis sibi invicem longe dissimilibus afficiuntur; manent quippe icterici, scorbutici, cachectici, phthifici, hectici, hydropici, qui morbi a frequentibus febris insultibus, habitu cacochymico ante nato, & nonnunquam regimine parum idoneo producti, tali methodo sæpe præcaveri potuissent. (59) (60)

Man-

QUÆST. 59. Annon hinc patet, quàm varia pro diversâ humorum dyscrasiâ a febre relictâ, requiritur medela, ut ad sanitatem perfectam, præ-

Manferunt adhuc fparfim variolæ fupra memoratæ, fenfim tamen vere appropinquante evanuerunt.

Vernalis hujus anni temperies a medio *Martii*, ad finem ferè *Aprilis*, fenfim caliditate crefcebat, fpirante vento occidentali. Annus 1730.

Duraverunt fparfim intermittentes prædictæ & morbi quidam inflammatorii, qui posteriores folito rariores in hoc anni tempore fe oftendebant. (61)

Circa

præfertim cùm sæpe redivit febris, reducantur aegri?

QUÆST. 60. An itaque catharfin omnem recte prohibet Sydenhamus? Et an conveniunt omnibus chalybeata, amara, aromatica, aliâque fimilia?

QUÆST. 61. Annon tepida & humida hyemis temperies, aerisque calor vernalis fenfim adauctus, cujus ope placidè & gradatim solvebantur humores, in causâ fint, cur rariùs acciderent morbi inflammatorii, quàm in annis quibusdam prioribus; eoque præcipuè cum post hyemem

Circa autem finem *Aprilis Mai-ique* initium spirabant aquilonares frigidi & ficci, quialvi fluores, ventris tormina, & passiones quasdam iliacas, ob retentum forsan perspirabile, & humores in interiora repulso prior catervæ addebant.

Circa medium *Maii* calidior fuit aer, & descendebant, pluviae vagæ erraticæ, quales in vernali tempore videre est. Hoc tempore paulò frequentiores fuerunt intermittentes, quæ in icterum non raro definebant, qui morbus solito frequentior fuit, aliosque febribus nequaquam affectos corripuit. (62)

Hæc

valde acrem & frigidam, adaucto subito in vere calore, tales morbos confertim apparere deprehensum est? Et annon hinc ulterius patent Quæst. 4. 26. 30. 35. 40. 46.

QUÆST. 62. Annon prægressæ hyemis temperies, inertis pituitæ copiam augendo, eamque in vâsculis, quibus aliàs magis languescit sanguinis motus, accumulando, huic effectui causam



Hæc cœli facies brevi evanuit, spirantibus enim borealibus solito frigidior & humidior evasit tempestas, eoque statu paucis exceptis diebus ad initium *Augusti* permanfit. Huic succedebat placida & serena cœli temperies, quæ per aliquas hebdomadas duravit, spirantibus plerumque occidentalibus.

Tota hæc æstas & autumnus salubres fuerunt, prout antea in æstate humida anni 1725 observavi, paucis morbis, iisque boni moris se ostendentibus; nisi quòd sub initium *Augusti* cholerâ levi quidam affecti sunt. Grassabantur etiam va-

causam præberet; quippe rarefcente ab aucto calore sanguine, in talium vasorum glandulas præ cæteris propelletur viscidum, easque obstruet; tale autem viscus esse hepar docet Anatomæ? Et annon hoc ulterius stabiliunt medicorum observationes, Venæ Portæ fabrica, & leges hydraulicæ?

riolæ

riolæ & morbilli in locis quibusdam vicinis, hac tamen urbe ante autumnum vix apparebant.

Posterior autumnus pars hyemis-que initium humida fuerunt & pluviosa, & frequentiores erant tum variolæ tum morbilli; pauci verò alii (exceptâ peripneumoniâ quâdam lentâ, quæ circa hyemis initium apparuit) se ostendebant febri-les morbi. Duravit humidus hic aeris status ad finem ferè *Novembris*, & ei succedebat acris gelu, nive & ventis aquilonaribus comitatum.

Hoc tempore surrexit subito ad summam fere altitudinem in Barometro hydrargyrum, & viginti circiter gradus descendit Thermometri spiritus, qui aeris status circa hebdomadam duravit.

Frigida hæc aeris temperatura peripneumonias adauxit, pleuritides etiam quasdam, & diarrhœas terminibus

minibus comitatas produxit ; pleuritides verò peripneumoniis multò fuerunt rariores ; forsan ob laxatum fibrarum tonum, minorem vesicularum inflationem in prægressâ humidâ temperie, aliasque causas in Quæst. 34. allatas, pulmonem præcæteris visceribus afficientes. Brevi iterum redivit gelu paucâ nive comitatum, iterumque sensim eodem temporis spatio solvebatur.

Manferunt adhuc variolæ, morbilli, aliæque nonnullæ febres eruptionibus cutaneis comitatæ, nequaquam tamen pravæ indolis, licet non æquè benignæ in hac tempestate ac mitiore prægressâ.

Initio *Januarii* ingens decidit nivis copia, & iterum redivit gelu, quod, paucis exceptis intervallis, per totum hunc mensem duravit, & initio sequentis solvebatur.

Hoc

Hoc tempore, adauctis viribus, grassari incipiebant morbi inflammatorii, iique qui variolis correpti sunt in pejus ruebant, & majorem morbi sævitiem quàm antea sustinebant.

Hac autem tempestate, urbem reliqui, & per aliquas septimanas aliò sum diversatus : Quantum tamen ab aliorum observationibus colligere potui, iisdem morbis comitata fuit hæc tempestas, tam durante gelu quàm circa ejus solutionem, quos in tali aeris constitutione antea numeravi ; qui vel a nimia vasorum stricture, humorum condensatione, & in vasa ob frigus externum retropulsione ; vel liquidorum, a soluto gelu, rarefactione, oriri videbantur. Quæ omnia, quo magis sunt subitanea & ab extrema & diuturna quâcunque temperie in contrariam celerius commutantur,

tur, eo majori vi corpora nostra afficere & morbos plures, eosque graviores producere solent, & vice versâ.

Diffolutum gelu sequebatur diuturna ficcitas, acribus spirantibus aquilonibus; quo tempore, præ cæteris morbis, grassatæ sunt pleuritides, hac tamen cum differentia ab iis quæ hyemis initio ægros obsidebant. Illæ enim languidos & ætate provectos, præ cæteris, occupabant, & iis frequentiores fuerunt peripneumonix; jam verò grassabantur veræ pleuritides, quæ juniores & ætate florentes, eosque præcipuè robustos & exercitados invaserunt.

Hic morbus pulsu duro, dolore summè acuto, pelliculâ crassâ inflammatoriâ, aliisque signis inflammationis fuit fociata; largasque postulabat evacuationes. Fuit enim hæc aeris constitutio ei non ab-  
fimilis



similis, quæ hyemem 1715 possidebat, nisi quod sæpe mitescebat, iterumque redibat gelu, unde minori vi corpus affecit frigus, & minor fuit ægrorum numerus. In ambobus autem diuturnæ gelosæque tempestatis effectum observare licet, summam scilicet ad inflammationes producendas proclivitatem, tam a majori solidorum stricture, quâ diminuuntur vasorum canales & pleniores fiunt, quàm a globulorum sanguineorum densitate, orientem. His quippe datis, a levi errore sæva orietur inflammatio. Unde misso & stagnante sanguine, naturali densior & nigrior evadet inferior crassamenti pars, formam magis sphaericam induet cruor, partemque sanguinis ferocem citius, & majori copiam, e sinu suo expellet; dum, ab iisdem causis tum formatur, tum sursum evehitur viscidum istud inflammam-

flammatorium, partem crassamenti superiorem occupans; ut clarissimè demonstrari posset, si ad rem nostram pertinebat. (63) (64) (65)

Noscunt

QUÆST. 63. Annon hæc aeris temperies, eaque anni 1723 cum earum contrariis comparatæ, morbique diversi in utrisque apparentes, Quæstiones multas prægressas ulterius probant?

QUÆST. 64. Annon a præcedente morborum serie patet, cur mulieribus, aliisque laxis & imbecilibus, quorum sanguis plerumque tenuis, rutilus est, & dissolutus, rarius accidunt pleuritides aliique morbi inflammatorii quàm viris, iisque robustis, tensis, & exercitatis; quorum fibræ sunt strictiores, & sanguis magis densus est & crassus: Et vice versâ, febres languidæ & nervosæ prioribus?

QUÆST. 65. Annon etiam ex iisdem, cum Quæst. 47. aliisque ibi citatis, comparatis patet, cur hisce delicatulis & lautè viventibus, quorum sanguis, acribus abundat particulis, febres remittentes, frequentius quàm veræ intermittentes summo frigore & tremore comitatæ, acciderent? Et vice versâ, cur rusticis, agricolis, aliisque victu lento, tenaci, & assiduo labore utentibus, febres hæc posteriores magis sint familiares, ratione habitâ ad ægrorum numerum, quàm prioribus?

Noscunt omnes coriaceam hanc materiem inflammationis comitem ferè esse individuum, quo tamen modo, in morbis his curandis, sit hujus materiæ solutio, non æquè patet; quippè cum extra corpus est, neque oleis, neque salibus, spiritibusve adhuc notis dissolvi potest; resolutâ autem inflammatione, circulantium liquidorum ope denuo solvi, sanis humoribus commisceri, similemque reddi noscimus.

Hoc verò in laxatione vasorum, & justo motûs moderamine, præ cæteris, poni videtur, eo quòd, his datis, nunquam non solvitur materies, etiamsi medicamentis toto cœlo diversis tractetur malum; modò tantâ copiâ non ingerantur, ut ab hoc statu aberrare cogatur natura. Cum verò hic effectus ab omni circulationis gradu non producitur, utpotè a nimis veloci au-  
getur

getur ; a tardo, vel etiam a motu liquidorum naturali frustrà expectatur ; non forsan inutile sit adnotare, tantam, ad hanc rem peragendam, requiri vasorum depletionem, utcunque magna illa sit, ut inde summo perè mitescant dolores & inflammatio, adeoque laxentur vasa, ut blando lenique madore sponte excitato, continuò humectetur corpus, cum pulsu molli & calore naturalem paulò tantùm superante.

Hoc statu corporis, evacuationibus remediisque debitis, inducto, modo ad tempus debitum sine doloris recrudescentiâ protrahatur, nulloque alio, hanc solvi materiem semper observavi ; & proinde non a certo quolibet medicamento, aut curandi methodo perfici posse ; sed plerumque medicamentis calorem attemperantibus, aliquando verò motum leniter cientibus, semper tamen diluen-

L

tibus

tibus, largâ copiâ exhibitis, esse tractandam.

Accidit quidè̃m haud rarò ægris plethoricis, dolore summo & inflammatione partis alicujus laborantibus, vi liquidorum circulantium & elateris fibrarum perpetuos exprimi sudores, magno comitante calore, cum pulsu forti & pleno; talem autem statum, tum ulteriorem postulare vasorum inanitionem, tum a statu descripto longissimè discrepare, nemo est qui non videt.

Duravit siccitas cum frigore descripto ad medium usque *Aprilis*, quo tempore deciderunt pluviae quædam frigidae, spirante plerumque vento, vel e plagis orientalibus, vel septentrionalibus, & manebat aer frigidus ferè ad *Maii* initium. Huic succedebat calida aeris temperies, levitèr spirantibus austris & occidentalibus.

Manferunt



Manferunt morbi inflammatorii per totam frigidam tempeſtatem; calidæ tamen accēſſu per dies aliquos frequentiores facti ſunt, & nonnullos de novo invaſerunt, qui jamjam convaluiffent. Solito etiam plures cephalalgia, paralyſi, & apoplexiâ percuſſi ſunt; & apparebant paucæ quædam febres languidæ, ſudoribus largis, ægritudine, ſpirituum dejectione, & nonnunquam diarrhœis comitatæ, quæ ſymptomata per vices irregulares ægrotos excruciabant, & mulieres laxas & imbecilles, præ cæteris, obſidebant. Horum quidam largo alvi profluvio eoque plerumque torminoſo, initio morbi correpti ſunt, quod iis, præ cæteris, accidit, quibus a frequenti diarrhœa, doloribus inteſtinorum aut ventriculi, debilitata fuiſſent viſcera abdominalia; ſæpe verò morbum ſolvit, ut hoc menſe anno 1728 ſupra

notavimus ; quo tempore calida temperies frigidæ subito successit. Hoc tamen tempore benignior minusque frequens fuit febris, ob minorem forsan caliditatem. (66)

Calidus hic aeris status brevi cessavit, manebat autem siccitas, quæ paucis exceptis diebus, quibus descendebant pluviae graves subitanæ, ultra medium *Augusti* porrecta est. Temperie autem suâ, quoad calorem & ventorum afflatum, mutabilis fuit hæc æstas, minori tamen gradu, quàm in prægressis ; ut ex

QUÆST. 66. Annon ex prægressa fibrarum strictura, auctoque motu a calore, patet hic in morbos inflammatorios effectus ? Et annon ex iisdem, cum Quæst. 1, 2, 3. comparatis, apparet tum nervorum resolutorum, tum diarrhœæ & sudorum causa ; quippe rarefcente sanguine, per eos corporis meatus, quibus præ cæteris facilis patebat exitus, seu per cutem, seu per intestina, ruebant humores ? Ad idem enim redit in vasa liquidorum nisus, seu eadem ratione augmentur moles & impetus fluidorum, seu coarctantur vasorum canales.

Thermo-

Thermometro apparuit, quod licèt frequentes variationes subiit, brevibus tamen limitibus se continebat.

Pauci morbi per totam hanc æstatem se ostendebant, hi verò ad speciem inflammatoriam plerumque pertinebant, sensimque tam numero quàm viribus decrescebant. His conjunctæ fuerunt remittentes quædam & intermittentes, nunc morbos inflammatorios, nunc febres languidas simulantes; hæ tamen nequaquam epidemicè grassatæ sunt, sed ex debilitatis priorum viribus oriri videbantur, eo quod rarò, nisi prægressis prioribus, iisque declinantibus apparebant.

Huic aeris temperiei succedebant pluvix largæ, spirantibus præ cæteris australibus, quæ in *Septembrem* porrectæ sunt, & diarrhœas quasdam, morbum Choleram dictum, aliasque intestinorum difficultates comites habuerunt

buerunt; hi tamen morbi neque frequenter neque diu se ostendebant.

Fuit hæc æstas admodum sicca; ratione verò ventorum longè dissimilis anno 1723. In ambobus autem diuturnæ siccitatis effectum aspicere licet, propensitatem scilicèt ad morbos inflammatorios, vario tamen gradu, producendum. Hæc enim ei non absimilis fuit, quoad morborum regnantium speciem, qui ferè omnes ad classẽ inflammatoriam pertinebant; gradu tamen multùm differre videbatur, eo quòd hac longè mitiores minusque frequentes fuerunt, cruorque minori gradu inflammatus; quod forsan miti & æquabili ejus calori, & lenibus Austri Zephyrique frequenter spirantium afflatibus, tribui potest. Per totum enim annum priorem spirabant Aquilones vel Euroaquilones, qui præ cæteris fibras constringunt, fluida densant,

fant, & diathesin inflammatoriam humoribus inducunt.

Hac verò æstate, placido lenique calore fovebatur corpus, & neque infueto calore exusti sunt humores, neque ventis acribus constricti canales. Ex quo non parùm probabile est, hunc annum prædicto 1723 ex toto similem fuisse, modo in his diversitatem non passus esset: Quippe utrisque præcessit humida temperies, dein huic succedere acris hyems & vernon dissimile; quæ omnes tempestates ejusdem generis morbos in utrisque comites habuerunt; donec placida & mitis hujus anni temperies, tam aeris quàm morbis grassantibus, varietatem induxit.

Paulò ante medium *Septembris* tepidum & placidum fuit cœlum, leviter spirantibus Austris, eaque temperie, paucis exceptis diebus, ad finem ferè *Novembris* permanfit, fu-

8 2 1 2 1 1 itque



itque tempeſtas admodum ſalubris.

Dedi tibi, Lector benevole, Epidemicorum ſeriem aſſidua obſervatione, & non ſine tædio natam, quam clarè & diſtinctè tradere, præ cæteris, in animo habui.

An autem in poſterum eodem ordine ſibi invicem ſuccedant Epidemici non aſſero; deſunt enim obſervationes, & manet ſucceſſionis modus problema adhuc irrefolubile, & forſan ſemper erit. Tuum autem eſt ulterius progredi, & ſi potes, nodum ſolvere; neque laboris te pænitebit, etiamſi ſcopum non attigeris. Mihi enim in praxi utiles fuerunt huiusmodi obſervationes, & tibi, ut ſpero, ſint emolumento: Sin aliter, viam monſtrando, vetuſtam licèt & obſoletam, qua utilis fiat in arte progreſſus, eas, aliquid boni rei medicæ allaturas, adhuc liceat ſperare.

*F I N I S.*

que tempore admodum laborat

Dei dei Lectio per se

gemmationem semine affluens

nonne et nonne et nonne

quidam et quidam et quidam

certis in animo habent

An etiam etiam etiam

hic etiam invicem invicem

mutuo etiam etiam etiam

etiam etiam etiam etiam

foris semper etiam etiam

est etiam etiam etiam

etiam etiam etiam etiam

per se etiam etiam etiam

etiam etiam etiam etiam

etiam etiam etiam etiam

etiam etiam etiam etiam

etiam etiam etiam etiam

etiam etiam etiam etiam

etiam etiam etiam etiam

etiam etiam etiam etiam

etiam etiam etiam etiam

etiam etiam etiam etiam

